

## **Ботаніка**

**DOI:** 10.36885/nzpm.2020.36.181-194

УДК 581.9

Кузярін О. Т.<sup>1</sup>, Сичак Н. М.<sup>2</sup>, Кагало О. О.<sup>2</sup>

### **СПОНТАННІ СУДИННІ РОСЛИНИ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ЗНЕСІННЯ» (М. ЛЬВІВ)**

На підставі проведених філорхорологічних досліджень, опрацювання провідних гербарних колекцій (LW, LWKS, LWS) та аналізу літературних джерел уперше складено список спонтанних судинних рослин для території регіонального ландшафтного парку «Знесіння». У складі спонтанної флори парку виявлено 727 видів, що за систематичною структурою розподіляються між 392 родами, 108 родинами, 59 порядками, 5 класами та 4 відділами. Уперше для території парку проведено повний облік сучасних локалітетів 30 раритетних видів, з яких, 15 включені до Червоної книги України та 15 видів є регіонально-рідкісними. Місцевозадовільнення таких раритетних видів національного значення, як *Dactylorhiza incarnata*, *Eriphragma palustris*, *Listera ovata*, *Lilium martagon*, *Orchis militaris* уперше наводяться для дослідженого території. Два види, зокрема *Cypripedium calceolus* та *Pulsatilla grandis*, що зазначені в Додатку I Бернської конвенції, на сьогодні вважаються зниклими в межах парку.

**Ключові слова:** фіторізноманіття, раритетні судинні рослини, охоронювані території.

Перспектива інтеграції природно-заповідної мережі України із загально-європейською та проблема збереження біорізноманіття привертають увагу до природоохоронних територій, особливо в межах урбанізованих екосистем. Відповідно до цього актуальним першочерговим завданням для кожного об'єкта природно-заповідного фонду є повна інвентаризація судинних рослин як бази ботанічного моніторингу.

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» (РЛП «Знесіння») був офіційно створений у 1993 р. задля збереження унікального природно-історичного комплексу гряди Знесіння та прилеглої зони, включно з територіями давніх передміських поселень – Знесіння та Кривчиці. Парк розташований на лісистому узгір'ї Львівського плато. Сам парк має площину 312,1 га, а з охоронною зоною – 785,71 га. Його оголошено об'єктом природно-заповідного фонду України. Він є одним із природних складових міста Львова, що з'єднує центр міста із зеленими смугами в передмісті та поза межами міста. РЛП «Знесіння» функціонує як вагомий рекреаційний об'єкт для громадян та гостей міста Львова. Його вагомість формується на значній різноманітності природних, культурних, історичних, археологічних і архітектурних цінностей території розташування. Природні ландшафти РЛП «Знесіння» є ключовими елементами у просторовій структурі Львівської міської екологічної мережі.

У межах сучасної території РЛП «Знесіння» виокремлюють такі основні структурно-функціональні частини:

- Березовий гай і болотисті луки;

- Гора Баба (Рід) (геоморфологічна пам'ятка природи);
- Гора Лева (Лиса гора) (структурно-денудаційний останцевий пагорб, геоморфологічна пам'ятка природи);
- Гора Стефана (структурно-денудаційний останцевий пагорб з відслоненнями неогенових відкладів у підніжжі при виході на Стару Стрільницю при дорозі до лікарні «Охматдит» (геоморфологічна пам'ятка природи);
- Гора Хомець (Хом);
- Долина потоку Хомець (гідрологічна пам'ятка природи);
- Долина струмків Кривчицький і Глибокий (гідрологічна пам'ятка природи);
- Озеро (став) на території малого кар'єру з відслоненнями тортонаських пісковиків;
- Лугопарк у прiterасному пониженні між Знесінням і Кривчицями (комплексна пам'ятка природи);
- Кайзервальд (парк «Стара Стрільниця») з відслоненнями тортонаських пісків у великому (центральному) кар'єрі «Кайзервальдські піски» та з відслоненнями вапняково-піщаних відкладів неогену (обриви над скульптурною фабрикою);
- Лижній спуск, урочище «Дебра» (геологічна пам'ятка у верхів'ях витоків Цвінтартного потоку);
- Цвінтарт старого Знесіння (середини XIX ст.);
- Музей народної архітектури та побуту (скансен «Шевченківський гай») від 1971 р.

Місцевість парку відчутно постраждала від розробок кар'єрів та заготівлі лісу. Первінний лісовий масив на пагорбах парку зазнав найбільших втрат за часів Першої світової війни, коли його вирубали на дрова. Ерозія ґрунтів, спричинена вирубками дерев та добуванням піску й каменю, спонукала міську владу до заходів щодо повторного озеленення голих схилів Кайзервальду. Відтак, перші деревні насадження з'явилися тут у 1951 р. [4].

Серед пам'яток природи особливу увагу заслуговує гора Хомець, зокрема її південний схил з рідкісними для регіону ксеротермними луками на дерново-карбонатних ґрунтах та північний схил із рештками природного дубово-буково-грабового лісу. У ботанічній літературі [6, 7, 12-16] гора Хомець здавна відома як цінна природоохоронна територія з низкою локалітетів раритетних судинних рослин, частина з яких на сьогодні на привеликий жаль втрачена.

### **Матеріал і методика дослідження**

Флористичні дослідження проводили на території РЛП «Знесіння» (у межах з охоронною зоною) упродовж польових сезонів 2019-2020 рр. за класичними методиками. При підготовці інвентаризаційного списку спонтанно поширеніх судинних рослин на території парку окрім результатів власних польових досліджень, використано матеріали гербарних колекцій (LW, LWKS, LWS), Національної мережі інформації з біорізноманіття (UkrBIN) [17], а також літературних [6, 7, 9-16] і архівних [1] джерел. У пропонованому списку судинних рослин родини розміщені за філогенетичною системою А. Л. Тахтаджяна [3], а роди та види – в алфавітному порядку. Номенклатуру таксонів наведено за С. Мосякіним, М. Федорончуком [8]. Деревні інвазійні види (ергазіофіти), що представлені на території парку лише молодими вегетативними

особинами, позначені в дужках ліteroю (j). Для видів, не підтверджених сучасними хорологічними даними, зазначено останній гербарний збір (прізвище збирача, рік збору та акронім гербарію) або ж літературне джерело (автор, рік видання) чи посилання на архівні матеріали парку (автор). Місцезнаходження (друга половина XIX – початок XXI століття) значної кількості видів рослин задокументовано гербарними зборами, що зберігаються, переважно, у гербаріях Державного природознавчого музею НАН України (LWS), Інституту екології Карпат НАН України (LWKS) і Львівського національного університету імені Івана Франка (LW).

### Результати дослідження

Фрагментарні відомості щодо поширення судинних рослин на території РЛП «Знесіння» представлені в гербарних колекціях (LW, LWKS, LWS та ін.), в UkrBIN, деяких літературних джерелах [6, 7, 9-16] та поодиноких архівних матеріалах [1].

Унаслідок проведених флористичних досліджень та детального аналізу гербарних зборів і літературних джерел нами складено інвентаризаційний список спонтанних судинних рослин, виявлених на території РЛП «Знесіння». Зазначений перелік, що наведено далі, нараховує 727 видів із 392 родів, 108 родин, 58 порядків, 7 класів та 5 відділів.

### Перелік судинних рослин з території РЛП «Знесіння»

<u>Equisetaceae</u>	<u>Polypodiaceae</u>
<i>Equisetum arvense</i> L.	<i>Polypodium vulgare</i> L.
<i>E. fluviatile</i> L.	
<i>E. hyemale</i> L.	
<i>E. palustre</i> L.	
<i>E. pratense</i> Ehrh. (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)	
<i>E. sylvaticum</i> L.	
<i>E. telmateia</i> Ehrh. (Кагало, Беднарська 15.07.2014 LWKS)	
<i>E. variegatum</i> Schleich. ex Web. & Mohr. (Кузярін 07.07.2001 LWS)	
<u>Ophioglossaceae</u>	<u>Cupressaceae</u>
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw. (Blocki 05.06.1882 LW)	<i>Thuja occidentalis</i> L. (j)
<u>Athyriaceae</u>	<u>Ceratophyllaceae</u>
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.
<u>Dryopteridaceae (Aspidiaceae)</u>	<u>Aristolochiaceae</u>
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	<i>Asarum europaeum</i> L.
<i>D. dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)	<u>Ranunculaceae</u>
<i>D. filix-mas</i> (L.) Schott	<i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb. (Wołoszczak 1897 LW)
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	<i>Actaea spicata</i> L.
<u>Aspleniaceae</u>	<i>Anemone nemorosa</i> L.
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. (Амехін)	<i>A. sylvestris</i> L. (Левицький 24.05.1925 LWS)
<i>A. trichomanes</i> L. (Амехін)	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
	<i>Caltha palustris</i> L.

<i>Clematis recta</i> L.	<i>B. pubescens</i> Ehrh.
<i>C. vitalba</i> L.	
<i>Ficaria verna</i> Huds.	<u>Corylaceae</u>
<i>Hepatica nobilis</i> Mill.	<i>Carpinus betulus</i> L.
<i>Isopyrum thalictroides</i> L. (Сичак, Кагало 14.04.2002 LWKS)	<i>Corylus avellana</i> L.
<i>Pulsatilla grandis</i> Wend. (Błocki 05.04.1901 LWS)	<u>Juglandaceae</u>
<i>Ranunculus acris</i> L.	<i>Juglans nigra</i> L. (j)
<i>R. bulbosus</i> L.	<i>J. regia</i> L.
<i>R. cassubicus</i> L.	
<i>R. lanuginosus</i> L.	<u>Caryophyllaceae</u>
<i>R. flammula</i> L.	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
<i>R. polyanthemos</i> L.	<i>Cerastium arvense</i> L.
<i>R. repens</i> L.	<i>C. holosteoides</i> Fries
<i>R. sardous</i> Crantz	<i>C. semidecandrum</i> L. (Rehman s. dat. LW)
<i>R. sceleratus</i> L.	<i>Coccyganthe flos-cuculi</i> (L.) Fourr. (= <i>Coronaria flos-cuculi</i> (L.) A.Br.)
<i>Thalictrum minus</i> L.	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)
	<i>Elisanthe noctiflora</i> (L.) Rupr. (Сичак 07.07.2002 LWKS)
<u>Berberidaceae</u>	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke
<i>Berberis vulgaris</i> L.	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.
	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench
<u>Papaveraceae</u>	<i>Oties eugeniae</i> (Kleop.) Klokov (Сичак 18.06.2002 LWKS)
<i>Chelidonium majus</i> L.	<i>Saponaria officinalis</i> L.
<i>Papaver rhoeas</i> L.	<i>Silene nutans</i> L.
	<i>S. vulgaris</i> (Moench) Garcke (= <i>Oberna begen</i> (L.) Ikonn.)
<u>Fumariaceae</u>	<i>Spergula arvensis</i> L. (Малиновський 1960 LWS)
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	<i>Stellaria graminea</i> L.
<i>Fumaria officinalis</i> L.	<i>S. holostea</i> L.
	<i>S. media</i> (L.) Vill.
<u>Moraceae</u>	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.
<i>Morus alba</i> L. (j)	
	<u>Amaranthaceae</u>
<u>Ulmaceae</u>	<i>Amaranthus albus</i> L. (Кагало, М.Кагало 29.07.2007 LWKS)
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	<i>A. cruentus</i> L. (= <i>A. paniculatus</i> L.)
<i>U. laevis</i> Pall.	<i>A. retroflexus</i> L.
<i>U. minor</i> Mill. (= <i>U. suberosa</i> Moench) (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)	
	<u>Chenopodiaceae</u>
<u>Cannabaceae</u>	<i>Atriplex micrantha</i> C.A.Mey. (Сичак 07.07.2002 LWKS)
<i>Cannabis ruderalis</i> Janisch. (Сичак 30.07.2002 LWKS)	<i>A. patula</i> L.
<i>Humulus lupulus</i> L.	<i>A. prostrata</i> Boncher ex DC.
	<i>Chenopodium album</i> L.
<u>Urticaceae</u>	<i>Ch. glaucum</i> L.
<i>Parietaria officinalis</i> L.	<i>Ch. hybridum</i> L.
<i>Urtica dioica</i> L.	<i>Ch. polyspermum</i> L.
	<i>Ch. strictum</i> Roth (Сичак 28.09.2002 LWKS)
<u>Fagaceae</u>	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. (Кагало, М.Кагало LWKS)
<i>Fagus sylvatica</i> L.	<i>Suaeda pannonica</i> G.Beck
<i>Quercus robur</i> L.	
<i>Q. rubra</i> L. (= <i>Q. borealis</i> Michx.)	
<u>Betulaceae</u>	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) P.Gaertn.	
<i>Betula pendula</i> Roth	

<u>Polygonaceae</u>	<i>Lepidium ruderale</i> L.
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre (Ковальчук 30.05.2009 UkrBIN: 138319)	<i>L. virginicum</i> L. (Сичак, М.Кагало 17.07.2011 LWKS)
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve (Сичак, М.Кагало 11.09.2005 LWKS)	<i>Lunaria annua</i> L.
<i>F. dumetorum</i> (L.) Holub	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.
<i>P. hydropiper</i> (L.) Delarbre	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser
<i>P. lapathifolia</i> (L.) Delarbre	<i>R. sylvestris</i> (L.) Besser
<i>P. minor</i> (Huds.) Opiz	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.
<i>P. maculosa</i> S.F.Gray	<i>S. officinale</i> (L.) Scop.
<i>Polygonum aviculare</i> L.	<i>Thlaspi arvense</i> L.
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	
<i>Rumex acetosa</i> L.	<u>Resedaceae</u>
<i>R. acetosella</i> L.	<i>Reseda lutea</i> L.
<i>R. confertus</i> Willd.	
<i>R. conglomeratus</i> Murray	<u>Salicaceae</u>
<i>R. crispus</i> L.	<i>Populus alba</i> L.
<i>R. maritimus</i> L.	<i>P. × berolinensis</i> (C.Koch) Dipp. (Сичак 28.08.2002 LWKS)
<i>R. obtusifolius</i> L. (= <i>R. sylvestris</i> (Lam.) Wallr.)	<i>P. × canadensis</i> Moench (Сичак 28.08.2002 LWKS)
	<i>P. nigra</i> L.
<u>Clusiaceae (Hypericaceae)</u>	<i>P. tremula</i> L.
<i>Hypericum hirsutum</i> L. (Кузярін 13.08.1990 LWS)	<i>Salix alba</i> L.
<i>H. perforatum</i> L.	<i>S. aurita</i> L.
	<i>S. caprea</i> L.
<u>Violaceae</u>	<i>S. cinerea</i> L.
<i>Viola collina</i> Besser (Krzemieniewski, 1926)	<i>S. fragilis</i> L.
<i>V. hirta</i> L.	<i>S. purpurea</i> L.
<i>V. mirabilis</i> L.	<i>S. triandra</i> L.
<i>V. odorata</i> L.	<i>S. viminalis</i> L.
<i>V. reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	
	<u>Ericaceae</u>
<u>Cistaceae</u>	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.
<i>Helianthemum ovatum</i> (Viv.) Dun.	
<u>Cucurbitaceae</u>	<u>Primulaceae</u>
<i>Bryonia alba</i> L.	<i>Androsace septentrionalis</i> L. (Tynecki 1866 LWS)
<i>Thladiantha dubia</i> Bunge	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
	<i>L. vulgaris</i> L.
<u>Brassicaceae</u>	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	<i>P. veris</i> L.
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	
<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	<u>Tiliaceae</u>
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	<i>Tilia cordata</i> Mill.
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	
<i>Bunias orientalis</i> L.	<u>Malvaceae</u>
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	<i>Althaea officinalis</i> L.
<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	<i>Malva neglecta</i> Wallr.
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	<i>M. sylvestris</i> L.
<i>Dentaria glandulosa</i> Waldst. & Kit. (Амехін)	
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	<u>Euphorbiaceae</u>
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	<i>E. helioscopia</i> L. (Сичак 19.10.2003 LWKS)
<i>Hesperis matronalis</i> L. (Степанишин 08.06.2020 UkrBIN: 157768)	<i>E. peplus</i> L.
	<i>E. virgata</i> Waldst. & Kit.
	<i>Mercurialis perennis</i> L.

<u>Thymelaeaceae</u>	M.Кагало 20.06.2005 LWKS)
<i>Daphne mezereum</i> L.	<i>P. sanguisorba</i> L.
<u>Grossulariaceae</u>	<i>Prunus divaricata</i> Ledeb.
<i>Ribes uva-crispa</i> L. (= <i>Grossularia uva-crispa</i> (L.) Mill.)	<i>P. domestica</i> L.
<u>Hydrangeaceae</u>	<i>P. spinosa</i> L.
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	<i>Pyrus communis</i> L.
<u>Crassulaceae</u>	<i>Rosa caesia</i> Sm. (Rehman 1894 LW)
<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	<i>R. canina</i> L.
<i>Sedum acre</i> L.	<i>R. corymbifera</i> Borkh. (= <i>R. dumetorum</i> Thuill.) (Błocki 1912 LWS)
<i>S. reflexum</i> L.	<i>R. majalis</i> Herrm.
<i>S. sexangulare</i> L.	<i>R. tomentosa</i> Smith
<i>S. spectabile</i> Boreau	<i>Rubus caesius</i> L.
<u>Saxifragaceae</u>	<i>R. hirtus</i> Waldst. & Kit.
<i>Saxifraga granulata</i> L. (Rehman 08.05.1888 LW)	<i>R. idaeus</i> L.
<i>S. tridactylites</i> L. (Łobaczewski 05.1855 LWS)	<i>R. plicatus</i> Weihe & Nees
<u>Parnassiaceae</u>	<i>R. sulcatus</i> Vest
<i>Parnassia palustris</i> L. (Амехін)	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Br.
<u>Rosaceae</u>	<i>Sorbus aucuparia</i> L.
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	<u>Fabaceae</u>
<i>A. procera</i> Wallr.	<i>Amorpha fruticosa</i> L.
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	<i>Anthyllis schivereckii</i> (DC.) Błocki (Зеленчук 20.06.1986 LW)
<i>Aruncus vulgaris</i> Rafin	<i>A. vulneraria</i> L. (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)
<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	<i>Astragalus cicer</i> L.
<i>C. mahaleb</i> (L.) Mill.	<i>A. glycyphyllos</i> L.
<i>C. vulgaris</i> Mill.	<i>A. onobrychis</i> L.
<i>Crataegus curvipespala</i> Lindm.	<i>Caragana arborescens</i> Lam.
<i>C. lindmanii</i> Hrabětova-Uhrová	<i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Woł.) Klásková
<i>C. monogyna</i> Jacq. (= <i>C. leiomonogyna</i> Klokov)	<i>Galega officinalis</i> L.
<i>Filipendula denudata</i> (J.Presl & C.Presl) Fritsch	<i>Genista tinctoria</i> L.
<i>F. vulgaris</i> Moench	<i>Lathyrus pratensis</i> L.
<i>Fragaria × ananassa</i> (Duchesne) Duchesne	<i>L. sylvestris</i> L. (Кагало 21.07.2008 LWKS)
<i>F. vesca</i> L.	<i>L. tuberosus</i> L.
<i>F. viridis</i> Duch.	<i>L. vernalis</i> (L.) Bernh.
<i>Geum rivale</i> L.	<i>Lembotropis nigricans</i> (L.) Griseb. (Познахівська, Рудка 12.07.1957 LW)
<i>G. urbanum</i> L.	<i>Lotus corniculatus</i> L.
<i>Malus domestica</i> Borkh. (j)	<i>Medicago falcata</i> L. aggr.
<i>Padus avium</i> Mill.	<i>M. lupulina</i> L.
<i>P. serotina</i> (Ehrh.) Ag.	<i>M. minima</i> (L.) Bartalini (Łobaczewski 1860 LWS)
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	<i>M. sativa</i> L. (Пашук 1962 LWS)
<i>Potentilla anserina</i> L.	<i>Melilotus albus</i> Medik.
<i>P. argentea</i> L.	<i>M. officinalis</i> (L.) Pall.
<i>P. erecta</i> (L.) Raeusch.	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.
<i>P. heptaphylla</i> L. (Сичак, Кагало 14.04.2002 LWKS)	<i>Ononis arvensis</i> L.
<i>P. norvegica</i> L.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
<i>P. obscura</i> Willd.	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen (= <i>Coronilla varia</i> L.)
<i>P. reptans</i> L.	<i>Trifolium alpestre</i> L.
<i>Poterium polygamum</i> Waldst. & Kit. (Кагало,	<i>T. arvense</i> L.
	<i>T. dubium</i> Sibth.
	<i>T. fragiferum</i> L.
	<i>T. hybridum</i> L.

<i>T. medium</i> L.	<u>Oxalidaceae</u>
<i>T. montanum</i> L.	<i>Oxalis acetosella</i> L.
<i>T. pratense</i> L.	<i>Xanthoxalis stricta</i> (L.) Small
<i>T. repens</i> L.	
<i>T. rubens</i> L.	<u>Geraniaceae</u>
<i>Vicia angustifolia</i> Reichard	<i>Geranium dissectum</i> L. (Сичак 19.10.2003 LWKS)
<i>V. cracca</i> L.	<i>G. palustre</i> L.
<i>V. pisiformis</i> L. (Krzemieniewski, 1926)	<i>G. phaeum</i> L.
<i>V. sepium</i> L.	<i>G. pratense</i> L.
<i>V. tenuifolia</i> Roth	<i>G. pusillum</i> L.
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	<i>G. pyrenaicum</i> Burm.f.
<i>V. villosa</i> Roth	<i>G. robertianum</i> L.
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	<i>G. sanguineum</i> L.
	<i>G. sibiricum</i> L.
	<u>Lythraceae</u>
<i>Lythrum salicaria</i> L.	<u>Balsaminaceae</u>
	<i>Impatiens parviflora</i> DC.
	<u>Onagraceae</u>
<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub	<u>Polygalaceae</u>
<i>Circaea lutetiana</i> L.	<i>Polygala amarella</i> Crantz (Сичак, М.Кагало 13.06.2004 LWKS)
<i>Epilobium adenocaulon</i> Hausskn.	<i>P. comosa</i> Schkuhr
<i>E. hirsutum</i> L.	<i>P. vulgaris</i> L.
<i>E. montanum</i> L.	
<i>E. parviflorum</i> Schreb.	<u>Cornaceae</u>
<i>E. roseum</i> Schreb.	<i>Cornus mas</i> L.
<i>Oenothera biennis</i> L.	<i>Swida sanguinea</i> (L.) Opiz
<i>O. rubricaulis</i> Klebahn	
	<u>Anacardiaceae</u>
<i>Rhus typhina</i> L. (j)	<u>Araliaceae</u>
	<i>Hedera helix</i> L.
	<u>Rutaceae</u>
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr. (j)	<u>Apiaceae</u>
	<i>Aegopodium podagraria</i> L.
	<i>Aethusa cynapium</i> L. (Rehman s. dat. LWS)
	<i>Angelica sylvestris</i> L.
	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.
	<i>Carum carvi</i> L.
	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.
	<i>C. hirsutum</i> L.
	<i>C. temulum</i> L.
	<i>Conium maculatum</i> L.
	<i>Daucus carota</i> L.
	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz
	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh. (Кузярін 2020 LWS)
	<i>Heracleum sibiricum</i> L.
	<i>H. sosnowskyi</i> Manden.
	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.
	<i>Pastinaca sativa</i> L.
	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr. (= <i>Cervaria rivini</i> Gaertn.)
	<i>P. oreoselinum</i> (L.) Moench
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.
	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L. (Попов 11.08.1945 LWS)
	<u>Linaceae</u>
<i>Linum austriacum</i> L. (Сичак 18.06.2002 LWKS)	
<i>L. catharticum</i> L.	
<i>L. flavum</i> L.	

<i>Seseli annuum</i> L.	<u>Gentianaceae</u>
<i>Siella erecta</i> (Huds.) M.Pimen.	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn (Іваницький 22.07.1948
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	LWS)
<u>Celastraceae</u>	<i>C. pulchellum</i> (Sw.) Druce
<i>Euonymus europaeus</i> L.	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.
<i>E. verrucosus</i> Scop.	<i>Gentianella amarella</i> (L.) Boern. (Стойко 16.09.1956 LWS)
<u>Rhamnaceae</u>	<i>G. lutescens</i> (Velen.) Holub (Wołoszczak 21.08.1885 LWS)
<i>Frangula alnus</i> Mill.	<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma (Tynecki 23.09.1865
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	LWS)
<u>Vitaceae</u>	<u>Rubiaceae</u>
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch	<i>Asperula cynanchica</i> L.
<i>Vitis vinifera</i> L.	<i>Crucia glabra</i> (L.) Ehrend.
<u>Santalaceae</u>	<i>Galium aparine</i> L.
<i>Thesium linophyllum</i> L.	<i>G. exoletum</i> Klokov (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)
<u>Loranthaceae</u>	<i>G. mollugo</i> L.
<i>Viscum album</i> L.	<i>G. odoratum</i> (L.) Scop.
<u>Oleaceae</u>	<i>G. palustre</i> L.
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	<i>G. verum</i> L.
<i>F. lanceolata</i> Borkh.	<u>Convolvulaceae</u>
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.
<i>Syringa vulgaris</i> L.	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
<u>Elaeagnaceae</u>	<u>Cuscutaceae</u>
<i>Hippophaë rhamnooides</i> L.	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.
<u>Caprifoliaceae</u>	<u>Boraginaceae</u>
(incl. <u>Sambucaceae, Viburnaceae</u> )	<i>Anchusa officinalis</i> L. (Сичак, М.Кагало 13.06.2004 LWKS)
<i>Sambucus ebulus</i> L.	<i>Echium vulgare</i> L.
<i>S. nigra</i> L.	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort. (Łobarzewski 1855 LWS)
<i>Symporicarpus albus</i> (L.) S.F.Blake (= <i>S. rivularis</i> Suksdorf)	<i>Lithospermum officinale</i> L.
<i>Viburnum opulus</i> L.	<i>Lycopsis arvensis</i> L. (Rehman s.dat. LWS)
<u>Valerianaceae</u>	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel. ex Schult. (Rehman s. dat. LWS)
<i>Valeriana officinalis</i> L.	<i>M. scorpioides</i> L.
<i>V. simplicifolia</i> (Rchb.) Kabath	<i>M. stricta</i> Roem. & Schult. (Rehman s.dat. LWS)
<u>Dipsacaceae</u>	<i>M. sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffmann
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	<i>Pulmonaria mollis</i> Wulf. ex Hornem (Krzemieniewski, 1926)
<i>D. sylvestris</i> Huds.	<i>P. obscura</i> Dumort.
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	<i>P. officinalis</i> L. (Скібіцька 10.03.2002 LWKS)
<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	<i>Symphytum officinale</i> L.
<u>Apocynaceae</u>	<u>Solanaceae</u>
<i>Vinca minor</i> L.	<i>Lycium barbatum</i> L.
<u>Asclepiadaceae</u>	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. (Амехін)	<i>Petunia × atkinsiana</i> D.Don ex Loudon (Сичак, М.Кагало 11.09.2005 LWKS)

*Physalis alkekengi* L. (= *Alkekengi officinarum* Moench) (Сичак 20.10.2001 LWKS)

*Solanum dulcamara* L.

*S. nigrum* L.

#### Scrophulariaceae

*Digitalis grandiflora* Mill.

*Euphrasia parviflora* Schag. (Лазебна 1971 LWS)

*E. stricta* D.Wolff ex J.F.Lehm.

*Lathraea squamaria* L. (Сичак, Кагало 14.04.2002 LWKS)

*Linaria vulgaris* Mill.

*Melampyrum arvense* L. (Blocki 1895 LWS)

*M. nemorosum* L.

*Odontites vulgaris* Moench

*Rhinanthus minor* L.

*Scrophularia nodosa* L.

*S. umbrosa* Dumort.

*Verbascum densiflorum* Bertol.

*V. lychnitis* L.

*V. nigrum* L.

*V. phlomoides* L.

*Veronica austriaca* L. (Blocki 07.06.1897 LW)

*V. arvensis* L. (Blocki 16.06.1907 LW)

*V. beccabunga* L.

*V. chamaedrys* L.

*V. filiformis* Smith

*V. hederifolia* L.

*V. officinalis* L.

*V. persica* Poir.

*V. spicata* L.

*V. teucrium* L. (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)

*V. verna* L. (Kotula 1876 LWS)

#### Orobanchaceae

*Orobanche alba* Steph.

*O. caryophyllacea* Smith (Сичак, М.Кагало 13.06.2004 LWKS)

*O. picridis* F.W.Schultz (Амехін)

#### Lentibulariaceae

*Utricularia vulgaris* L.

#### Plantaginaceae

*Plantago lanceolata* L.

*P. major* L.

*P. media* L.

#### Lamiaceae

*Acinos arvensis* (Lam.) Dandy

*Ajuga genevensis* L.

*A. reptans* L.

*Ballota nigra* L.

*Betonica officinalis* L.

*Clinopodium vulgare* L.

*Galeobdolon luteum* Huds.

*Galeopsis bifida* Boenn.

*G. pubescens* Besser

*G. tetrahit* L.

*Glechoma hederacea* L.

*G. hirsuta* Waldst. & Kit.

*Lamium album* L.

*L. maculatum* (L.) L. subsp. *cupreum* (Schott) Hadač (Сичак, Кагало 14.04.2002 LWKS)

*L. purpureum* L.

*Leonurus quinquelobatus* Gilib.

*Lycopus europaeus* L.

*Melittis sarmatica* Klokov

*Mentha arvensis* L.

*M. longifolia* (L.) Huds.

*M. × piperita* L.

*M. suaveolens* Ehrh.

*Origanum vulgare* L.

*Prunella vulgaris* L.

*Salvia glutinosa* L.

*S. pratensis* L.

*S. verticillata* L.

*Stachys germanica* L.

*S. palustris* L.

*S. recta* L.

*S. sylvatica* L.

*Teucrium chamaedrys* L.

*Thymus alternans* Klokov (Завада 06.06.1968 LW)

*T. glabrescens* Willd. (Tyniecki 10.06.1880 LWS)

*T. pulegioides* L. agr.

*T. serpyllum* L. (Малиновський 09.10.1960 LWS)

#### Campanulaceae

*Campanula glomerata* L.

*C. persicifolia* L.

*C. rapunculoides* L.

*C. sibirica* L.

*C. trachelium* L.

#### Asteraceae

*Achillea millefolium* agg.

*Ambrosia artemisiifolia* L. (Сичак, М.Кагало 17.07.2011 LWKS)

*Anthemis tinctoria* L. (Іваницький 1948 LWS)

*Aposeris foetida* (L.) Less.

*Arctium lappa* L.

*A. tomentosum* Mill.

*Artemisia absinthium* L.

*A. annua* L. (Кузярін 10.05.2001 LWS)

*A. campestris* L.

*A. marschalliana* Spreng. (Сичак 28.08.2002 LWKS)

*A. vulgaris* L.

- Aster amellus* L. (Кузярін 13.08.1990 LWS)  
*Bellis perennis* L.  
*Bidens frondosa* L.  
*B. tripartita* L.  
*Carduus acanthoides* L.  
*C. crispus* L.  
*Carlina biebersteinii* Bernh. ex Hornem.  
*Centaurea cyanus* L.  
*C. jacea* L.  
*C. stoebe* L. (= *C. rhenana* Boreau)  
*C. scabiosa* L.  
*C. stricta* Waldst. & Kit.  
*Cichorium intybus* L.  
*Cirsium arvense* (L.) Scop.  
*C. canum* (L.) All.  
*C. oleraceum* (L.) Scop.  
*C. palustre* (L.) Scop.  
*C. pannonicum* (L.f.) Link  
*C. rivulare* (Jacq.) All.  
*C. vulgare* (Savi) Ten.  
*Conyza canadensis* (L.) Cronq.  
*Cosmos bipinnatus* Cav. (Кузярін 2001 LWS)  
*Crepis biennis* L.  
*C. capillaris* (L.) Wallr. (Зеленчук, Кардаш 1986 LW)  
*C. paludosa* (L.) Moench  
*C. praemorsa* (L.) Tausch  
*C. rhoeadifolia* M.Bieb. (Blocki 1912 LW)  
*C. tectorum* L.  
*Echinops sphaerocephalus* L.  
*Erigeron acris* L.  
*Eupatorium cannabinum* L.  
*Galatella linosyris* (L.) Rchb.f. (Krzemieniewski, 1926)  
*Galinsoga parviflora* Cav.  
*G. quadriradiata* Ruiz & Pav. (= *G. urticifolia* (Kunth) Benth.)  
*Gnaphalium sylvaticum* L.  
*G. uliginosum* L.  
*Helianthus tuberosus* L.  
*Helichrysum arenarium* (L.) Moench (Łobarzewski 1860 LWS)  
*Hieracium borodinianum* Juxip (= *H. lachenalii* Suter)  
*H. sabaudum* L. aggr.  
*H. umbellatum* L.  
*Hypochoeris radicata* L.  
*Inula britannica* L. (Амехін)  
*I. ensifolia* L.  
*I. hirta* L.  
*I. salicina* L.  
*Iva xanthifolia* Nutt. (= *Cyclachaena xanthifolia* (Nutt.) Fresen.)  
*Lactuca serriola* L.  
*Lapsana communis* L.  
*Leontodon autumnalis* L.  
*L. danubialis* Jacq. (Скібіцька 10.03.2002 LWKS)  
*L. hispidus* L.  
*Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt. (= *Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb.)  
*Leucanthemum vulgare* Lam.  
*Mycelis muralis* (L.) Dumort.  
*Phalacroloma annuum* (L.) Dumort. (= *Stenactis annua* Nees)  
*Petasites hybridus* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  
*Picris hieracioides* L.  
*Pilosella officinarum* F.Schult. & Sch.Bip.  
*P. × polymastix* (Peter) Holub (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)  
*P. praealta* (Vill. ex Goehn) F.Schultz & Sch. Bip.  
*Pyrethrum parthenifolium* Willd. (Сичак 02.10.2005 LWKS)  
*Scorzonera purpurea* L. (Krzemieniewski, 1926)  
*Senecio jacobaea* L.  
*S. umbrosus* Waldst. & Kit. (Blocki 31.07.1906 LW)  
*S. vernalis* Waldst. & Kit.  
*S. viscosus* L. (Сичак, М.Кагало 17.07.2011 LWKS)  
*S. vulgaris* L.  
*Serratula tinctoria* L.  
*Solidago canadensis* L.  
*S. gigantea* Aiton (= *S. serotinoides* Á.Löve & D.Löve)  
*S. virgaurea* L.  
*Sonchus arvensis* L.  
*S. asper* (L.) Hill (Сичак 19.10.2003 LWKS)  
*S. oleraceus* L.  
*S. palustris* L.  
*Sympyotrichum lanceolatum* (Willd.) G.L.Nesom (= *Aster lanceolatus* Willd.) (Сичак 19.10.2003 LWKS)  
*S. novi-belgii* (L.) Nesom (= *Aster novi-belgii* L.)  
*S. × salignus* (Willd.) Nesom (= *A. × salignus* Willd.)  
*Tanacetum vulgare* L.  
*Taraxacum laevigatum* DC. (Кузярін 23.04.1991 LW)  
*T. officinale* Wigg. agr.  
*Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg.  
*Tragopogon major* Jacq.  
*T. pratensis* L. (Кагало, М.Кагало 20.06.2005 LWKS)  
*Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch.Bip. (= *Matricaria perforata* Mérat)  
*Triplium pannonicum* (Jacq.) Dobrocz.  
*Tussilago farfara* L.  
*Xanthium albinum* (Widd.) H.Scholz (Сичак, М.Кагало 11.09.2005 LWKS)

<u>Alismataceae</u>	<u>Iridaceae</u>
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	<i>Iris pseudacorus</i> L.
<u>Hydrocharitaceae</u>	<u>Orchidaceae</u>
<i>Elodea canadensis</i> Michx. (Сичак, М.Кагало 13.06.2004 LWKS)	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce
<i>Stratiotes aloides</i> L.	<i>C. longifolia</i> (L.) Fritsch. (Кагало, Сичак 31.05.2004 LWKS)
<u>Juncaginaceae</u>	<i>Cypripedium calceolus</i> L. (Krzemieniewski, 1926)
<i>Triglochin palustre</i> L.	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó (Амехін) <i>D. incarnata</i> (L.) Soó (Кузярін 06.06.2000 LWS)
<u>Potamogetonaceae</u>	<i>D. lapponica</i> (Laest.) Soó (Кагало, Сичак 31.05.2004 LWKS)
<i>Potamogeton crispus</i> L. (Сичак, М.Кагало 13.06.2004 LWKS)	<i>D. majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerhayes
<i>P. pectinatus</i> L.	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz
<u>Hemerocallidaceae</u>	<i>E. palustris</i> (L.) Crantz (Кузярін 06.06.2000 LWS)
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br. <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br. (Сичак, М.Кагало 13.06.2004 LWKS)
<u>Liliaceae</u>	<i>Orchis militaris</i> L. (Кагало, Сичак 31.05.2004 LWKS)
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	<i>O. morio</i> L. (Шмідт 24.05.1855 LW)
<i>Lilium candidum</i> L.	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.
<i>L. martagon</i> L.	
<i>Tulipa × hybrida</i> hort.	
<u>Asphodelaceae</u>	<u>Juncaceae</u>
<i>Anthericum ramosum</i> L.	<i>Juncus articulatus</i> L.
<u>Hyacinthaceae</u>	<i>J. bufonius</i> L.
<i>Scilla bifolia</i> L.	<i>J. compressus</i> Jacq.
<u>Alliaceae</u>	<i>J. effusus</i> L.
<i>Allium oleraceum</i> L.	<i>J. inflexus</i> L.
<i>A. ursinum</i> L.	<i>J. nastanthus</i> V.Krecz. & Gontsch. (Кузярін 13.08.2001 LWS)
<u>Amaryllidaceae</u>	<i>J. tenuis</i> Willd.
<i>Galanthus nivalis</i> L.	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.
<i>Leucojum vernum</i> L.	<i>L. multiflora</i> (Ehrh.) Lej.
<i>Narcissus poeticus</i> L.	<i>L. pilosa</i> (L.) Willd.
<i>N. pseudonarcissus</i> L.	
<u>Convallariaceae</u>	<u>Cyperaceae</u>
<i>Convallaria majalis</i> L.	<i>Carex acuta</i> L.
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	<i>C. acutiformis</i> Ehrh.
<i>Polygonatum hirtum</i> (Bosc ex Poir.) Pursh (Кузярін 08.06.1998 LWS)	<i>C. brizoides</i> L.
<i>P. multiflorum</i> (L.) All.	<i>C. caryophyllea</i> Latourr.
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce	<i>C. contigua</i> Hoppe
<u>Asparagaceae</u>	<i>C. digitata</i> L.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	<i>C. distans</i> L.
<u>Trilliaceae (Melanthiaceae)</u>	<i>C. disticha</i> Huds.
<i>Paris quadrifolia</i> L.	<i>C. flacca</i> Schreb.
	<i>C. flava</i> L.
	<i>C. hirta</i> L.
	<i>C. humilis</i> Leyss. (Амехін)
	<i>C. leporina</i> L. (= <i>C. ovalis</i> Gooden.)
	<i>C. michelii</i> Host (Кузярін 23.04.1991 LWS)
	<i>C. montana</i> L. (Кузярін 23.04.1991 LWS)
	<i>C. nigra</i> (L.) Reichard
	<i>C. pallescens</i> L.

<i>C. panicea</i> L.	<i>F. gigantea</i> (L.) Vill.	
<i>C. pilosa</i> Scop.	<i>F. heterophylla</i> Lam. (Rehman s. dat. LW)	
<i>C. pseudocyperus</i> L.	<i>F. ovina</i> L.	
<i>C. sylvatica</i> Huds.	<i>F. pratensis</i> Huds.	
<i>C. tomentosa</i> L.	<i>F. rubra</i> L. s. str.	
<i>C. vulpina</i> L.	<i>Glyceria maxima</i> (C.Hartm.) Holmberg	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	<i>G. nemoralis</i> (Uechtr.) Uechtr. & Koern.	
<i>E. uniglumis</i> (Link) Schult.	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	<i>Holcus lanatus</i> L.	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	<i>Hordeum murinum</i> L.	
<b>Poaceae</b>		
<i>Agrostis capillaris</i> L. (= <i>A. tenuis</i> Sibth.)	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	
<i>A. gigantea</i> Roth	<i>Lolium perenne</i> L.	
<i>A. stolonifera</i> L.	<i>Melica nutans</i> L.	
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	<i>Milium effusum</i> L.	
<i>A. pratensis</i> L.	<i>Panicum miliaceum</i> L. (Кагало 27.07.2002 LWKS)	
<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski	<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rausch.	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.Presl & C.Presl	<i>P. pratense</i> L.	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	
<i>B. sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	<i>Poa annua</i> L.	
<i>Briza media</i> L.	<i>P. bulbosa</i> L. (s. coll. 05.06.1961 LW)	
<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub	<i>P. compressa</i> L.	
<i>B. erecta</i> (Huds.) Fourr.	<i>P. nemoralis</i> L.	
<i>B. inermis</i> (Leyss.) Holub	<i>P. palustris</i> L.	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. (= <i>B. mollis</i> L.)	<i>P. pratensis</i> L.	
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	<i>P. trivialis</i> L.	
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. (Кагало 27.07.2002 LWKS)	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	<i>Setaria glauca</i> (L.) P.Beauv.	
<i>D. polygama</i> Horv.	<i>S. verticillata</i> (L.) P.Beauv.	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	<i>S. viridis</i> (L.) P.Beauv.	
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muehl.	<i>Sieglingia decumbens</i> (L.) Bernh.	
<i>D. sanguinalis</i> (L.) Scop.	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	
<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv.		
<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski (Сичак 07.07.2002 LWKS)	<b>Lemnaceae</b>	
<i>E. repens</i> (L.) Nevski	<i>Lemna minor</i> L.	
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	<i>L. trisulca</i> L. (Степанишин 09.06.2020 UkrBIN: 157762)	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	<b>Typhaceae</b>	
	<i>Typha latifolia</i> L.	
	<i>T. laxmannii</i> Lepech.	

Порівняльний аналіз систематичної структури інвентаризаційного списку судинних рослин РЛП «Знесіння» свідчить про істотне переважання родин, родів та видів із відділу Magnoliophyta. Серед них панівна частка (77,7%) належить представникам класу Magnoliopsida, натомість клас Liliopsida представлений значно менше (19,3%). При цьому спорові та хвойні рослини становлять лише 3,0% від загальної кількості видів. В умовах антропопресингу на порівняно невеликій території парку спонтанна флора зазнає постійних структурних і якісних змін. Її формують три основні групи таксонів, що сформували спонтанні популяції: аборигенні, ксенофіти або випадково занесені адвентивні таксони та ергазіофіти або натурализовані (здичавілі) інтродукенти.

Проведеними дослідженнями підтверджено, що в деревних композиціях парку, окрім екзотичних (чужорідних), широко використано аборигенні види та їхні паркові форми, зокрема *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Betula pendula*, *Quercus robur*, *Carpinus betulus*, *Sorbus aucuparia*, *Pinus sylvestris*, *Picea abies*, *Viburnum opulus*, *Tilia cordata*, *Cerasus avium*, *Juniperus communis* та ін.

### Висновки

На підставі проведених флорохорологічних досліджень, опрацювання провідних гербарних колекцій (LW, LWKS, LWS) та аналізу літературних джерел уперше складено список спонтанних судинних рослин для території регіонального ландшафтного парку «Знесіння». У складі спонтанної флори парку виявлено 727 видів, що за систематичною структурою розподіляються між 392 родами, 108 родинами, 59 порядками, 5 класами та 4 відділами. Уперше для території парку проведено повний облік сучасних локалітетів 30 раритетних видів, з яких, 15 включені до Червоної книги України [5] і 15 видів є регіонально-рідкісними [2]. Місцевознаходження таких раритетних видів національного значення, як *Dactylorhiza incarnata*, *Epipactis palustris*, *Listera ovata*, *Lilium martagon*, *Orchis militaris* уперше наводяться для дослідженого території. Два види, зокрема *Cypripedium calceolus* та *Pulsatilla grandis*, що зазначені в Додатку I Бернської конвенції, на сьогодні вважаються зниклими в межах парку.

1. Амехін О. О. Додаток до пояснівальної записки геоботанічної інвентаризації ландшафтно-історичного парку «Знесіння». Перелік видів рослин, що підлягають охороні та збереженню на території ландшафтно-історичного парку «Знесіння» // Архівні матеріали РЛП «Знесіння».
2. Кагало О. О., Сичак Н. М. Матеріали для нового (уточненого) переліку видів рослин, що потребують охорони на території Львівської області як основа для підготовки «Червоної книги Львівської області. Рослинний світ» // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2014. – Т. 5(12), № 1. – С. 59-80.
3. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1987. – 548 с.
4. Пosaцький Б. Архітектура тоталітаризму (1940-1956) // Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ-ХХІ ст., ред. Ю. Бірюльов. – Львів : Центр Європи, 2008. – С. 578-605.
5. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.
6. Besser W. Ennumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia gubernia Kiovensi, Bessarabia cis Thyraica et Circa Odessam collectarum simul cum observationibus in Primititas Flora Galiciae Austriacae. – Vilnae, 1822. – 111 s. [In Latin]
7. Krzemieniewski S. Chomiec w Krzywczycach pod Lwowem (Na podstawie referatów

- Prof. Dra J. Łomnickiego i Dra T. Wilczyńskiego) // Ochrona przyrody, 1926. – Zeszyt 6. – S. 72-75. [In Polish]
8. Mosyakin S., Fedoronchuk M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev: Inst. Bot., 1999. – 345 p. [In English]
  9. Raciborski M. Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin // Kosmos. – 1910. – R. 35. – S. 352-366. [In Polish]
  10. Raciborski M. Rośliny polskie (Plantae polonicae; Nr. 1-400) // Kosmos. – 1910. – R. 35. – S. 739-767. [In Polish]
  11. Raciborski M. Drobiazgi florystyczne // Kosmos. – 1911. – R. 36. – S. 1096-1104. [In Polish]
  12. Szafer W. Osobliwości i zabytki flory okolic Lwowa // Rozpr. i Wiad. z Museum im. Dzieduszyckich. – 1914. – T. 1, zesz. 1 i 2. – S. 102-109. [In Polish]
  13. Tomaschek A. Flora der Umgebung Lemberg's. Aus den Verhandlungen d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. – Wien, 1859. – Erster Beitrag. – 12 S.; 1862. – Dritter Beitrag. – 24 S. [In German]
  14. Tomaschek A. Vierter Beitrag zur Flora der Umgebung von Lemberg. Die Gefäßpflanzen der Umgebung Lemberg's. – Wien, 1862. – S. 870-966. [In German]
  15. Tomaschek A. Flora der Umgebung von Lemberg und des östlichen Galiziens überhaupt. (Aus den Verhandlungen d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. [Jahrgang 1866] besonders abgedruckt.). – Wien, 1866. – 6 S. [In German]
  16. Zawadzki A. Flora der stadt Lemberg, oder Beschreibung, der um Lemberg wildwachsenden Pflanzen, nach ihrer Blüthezeit geordnet. – Lemberg, 1836. – 230 S. [In German]
  17. Plantae 2020. In UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. UkrBIN, Database on Biodiversity Information. Available from: <http://www.ukrbin.com/index.php?id=343503> (November 08, 2020).

<sup>1</sup> Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів  
e-mail: kuzyarin@gmail.com;

<sup>2</sup> Інститут екології Карпат НАН України, м. Львів  
e-mail: sytschak@ukr.net; e-mail: kagaloalexander@gmail.com

Kuzyarin O. T., Sytschak N. N., Kagalo A. A.

#### Spontaneous vascular plants for the territory of the Znesinnya Regional Landscape Park (Lviv)

On the base of research florochorology, studing the main herbarion collections (LW, LWKS, LWS) and analisis the literature the checklist of the spontaneous vascular plants for the territory of the Znesinnya Regional Landscape Park has been compiled. Some 727 species from 392 genera, 108 families, 59 orders, 5 classes and 4 divisions are presented from the investigated area. Among them, the most common part (77.7%) belongs to the representatives of the Magnoliopsida class, while the Liliopsida class of representations is significantly less (19.3%). With a wide range of disputes, coniferous trees are stocked less than 3.0% of all types. The species distribution to the leading families and genera have been analysed. For the first time were recorded the present habitats of 30 rare species (15 from the Red Data Book of Ukraine, and 15 species are rare in the region). The locations of the rare species with state sozological status (*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó, *Epipactis palustris* (L.) Crantz, *Listera ovata* (L.) R.Br., *Lilium martagon* L., *Orchis militaris* L.) were offered for the first time. Two species from addition of the First Bern Convention (*Cypripedium calceolus* and *Pulsatilla grandis*) are disappeared on the territory of the park.

**Key words:** phytodiversity, rare vascular plants, protected areas.