

М.М. ФЕДОРОНЧУК

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, Київ, 01001, Україна

**ВИДИ СУДИННИХ РОСЛИН,
ОПИСАНІ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ,
ТА ЇХ ТИПІФІКАЦІЯ: РОДИНА
ROSACEAE JUSS. (РІД *RUBUS* L.)**

Ключової слова: вид, тип, *Rubus*, типіфікація, таксономія, номенклатурна комбінація, поширення, екологічно-ценотичні особливості, Україна.

У даній статті наводиться список видів роду *Rubus* L. (21) (*Rosaceae* Juss), описаних з території України. Майже всі вони (20) були описані С. Юзепчуком з Криму. Типіфікація видів проведена на основі аналізу автентичних зразків та протологів. Для кожного виду вказуються літературна цитата, основана синоніміка, місце опису та типовий екземпляр (голотип або лектотип) і місце його зберігання. Іноді замість конкретного типу цитується лише протолог (звідки вид був описаний), якщо з тих чи інших об'єктивних причин неможливо було вибрати лектотип чи неотип. В разі потреби викладаємо також свої міркування відносно таксономічного статусу деяких видів. Для таксонів, визнаних самостійними, вказані екологічно-ценотичні особливості та характер поширення. Список видів наводиться в алфавітному порядку.

***RUBUS* L.**

1. *R. aipetriensis* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 104; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 2: 39.

Вид описано з Криму (Habitat in pinetis supra Jaltam): «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, в сосновом лесу у дороги, 22.07.1935, цв., отцв., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 308)» (за протологом).

Typus: «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, в сосновом лесу у дороги, 22.07.1935, цв., отцв., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 308)» (LE, holotypus, in herb. sector europ.).

Примітка. Більшість авторів розглядають його як одну із перехідних форм *R. crimea* Juz., *R. tomentosus* Borkh. і *R. taureus* Schlecht. ex Juz.

— В соснових лісах Гірського Криму. Ендемік.

2. *R. aqua-frigidae* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 100.

Вид описано з Криму (... на територии Государственного заповедника: «Государственный заповедник, подъем (по хребтику) от перевала Кебит-богаз к поляне Узун-алан, опушка лиственного леса, у источника, 19.08.1948, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 1341)» (за протологом).

© М.М. ФЕДОРОНЧУК, 2004

Typus: «Государственный заповедник, подъем (по хребтику) от перевала Кебит-богаз к поляне Узун-алан, опушка лиственного леса, у источника, 19.08.1948, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 1341)» (*LE*, holotypus, in herb. sector europ.).

3. *R. almensis* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 93; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 41.; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 227, pro hybr. *R. tauricus* Schlecht. ex Juz. x *R. tomentosus* Borkh.; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163, pro hybr. *R. tauricus* x *R. tomentosus*.

Вид описано з Криму (Habitat ad margines silvarum et viarum, in vallis fluviorum): «Крымский Государственный заповедник, близ Биологической станции, по дороге к Чучельскому пер., 18.07.1935, цв., С. Юзепчук (Fl. taur. select., N 263); там же, Центральная котловина, Романовское шоссе (по пути к Чучельскому пер.), 24.07.1946, отцв., незр. пл., он же (Раст. Крыма, № 232, 233)» (за протологом).

Typus: «Гос. заповедник, центральная котловина, Романовское шоссе (по пути к Чучельскому перевалу). — In reservato publico, 24.07.1948, № 232, S. Juzepchuk (*LE*, lectotypus, isolectotypus: L. Krassovskaja, 2001, in herb. sector europ.).

Примітка. Займає проміжне місце між *R. tauricus* і *R. tomentosus*.

— На узліссях букових лісів у Гірському Криму. Ендемік.

4. *R. crimaeus* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 99; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 39; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 226; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163.

Вид описано з Криму (Habitat in Tauria meridionali in ditione opp. Jalta): «На спуске с горы Ай-Петри, бл. Пендикуля, 22.07.1935, отцв., № 1310, С. Юзепчук; там же, в сосновом лесу ниже Пендикуля, 22.07.1938, отцв., № 316, С. Юзепчук; там же, между Пендикулем и Учан-Су, 22.VI.1939, отцв., незр. пл., № 320, 322, С. Юзепчук; на спуске с горы Ай-Петри, бл. Пендикуля, у шоссе, 09.08.1946, отцв., незр. пл., № 282, 278, С. Юзепчук; там же между Пендикулем и Учан-Су, у шоссе, 02.07.1946, незр. пл., № 287, 297, С. Юзепчук» (за протологом).

Typus: «In vicinis opp. Jalta, prope sanatorium Islar, 22.07.1935, № 324, S. Juzepercuk (Pl. taur. select.) (*LE*, lectotypus: L. Krassovskaja, 2000, in herb. sector europ.).

Примітка. Від інших кримських видів роду відрізняється характером опушенння туріонів і листків, морфологією суцвіття та іншими, менш значущими ознаками.

— У соснових і змішаних лісах Гірського Криму. Ендемік.

5. *R. eurythysiger* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 101; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 39.

Вид описано з Криму (Habitat in litore meridionali Tauriae supra opp. Jalta): «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, у шоссе, 02.08.1946, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 279)» (за протологом).

Typus: «На спуске с г. Ай-Петри, бл. казармы Пендикуль, у шоссе. 02.08.1946, № 279, С. Юзепчук (LE, holotypus, in herb. sector europ.)».

Примітка. Деякі автори схильні розглядати його як переходну форму між *R. cristaus* Juz., *R. tomentosus* і *R. tauricus*.

— На узліссях соснових і змішаних лісів, біля доріг у Гірському Криму. Ендемічний кримський вид.

6. *R. hirtimimus* Juz. 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 108; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 43; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 225; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 162.

Вид описано з Криму (Habitat cum praecedente, imprimis ad margines silvarum et in silvis partium excisis): «Крымский Государственный заповедник, в лесу на подъеме от пер. Кебит-богаз к поляне Узун-алан, 16.07.1935, цв., С. Юзепчук (Pl. taig. selectae, № 251); там же, 24.07.1946, отцв., он же (Раст. Крыма, № 239, 244, 245, 246); там же, 06.08.1948, отцв., пл. (Раст. Крыма, № 1108, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117); там же, в лесу близ пер. Кебит-богаз (по направлению к горе Чатыр-даг), 23.06.1949, цв., он же (Раст. Крыма, № 1171)» (за протологом).

Typus: «Гос. заповедник, на подъеме от перевала Кебит-богаз к поляне Узун-алан. — In reservato Publ. supra traject. Kebit-bogas, 06.08.1948, № 1114 (Раст. Крыма). S. Juzepczuk» (LE, lectotypus: L. Krassovskaja, 2000, in herb. sector europ.).

Примітка. Габітуально, особливо в стані цвітіння, нагадує види секції *Glandulosi*, зокрема *R. hirtus* Waldst. et Kit. Не виключено, що є видом гібридогенного походження.

— На галевинах у Гірському Криму. Ендемік.

7. *R. x kalaiae* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 110; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 44; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 226, pro hybr. *R. caesius* L. x *R. sp.*; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 162, pro syn. *R. caesius* L.

Вид описано з Криму (Habitat ad rivos, ad sepes et in hortis (vinetis) litoris meridionalis Tauriae): «Никитский бот. сад, у края виноградника возле моря, 12.07.1946, цв., пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 82)» (за протологом).

Typus: «Никитский ботанический сад, по краю виноградника возле берега моря. 12.07.1946. Leg. Juzepczuk (Раст. Крыма, № 82)» (LE, holotypus, in herb. sector europ.).

Примітка. Про гібридогенне походження виду (*R. caesius* L. x *R. tauricus*) свідчить формування недорозвинених плодів на більшості плодоносних гілок.

— На відкритих схилах, по берегах річок на Південному березі Криму. Ендемік.

8. *R. marschallianus* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 104; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 42.

Вид описано з Криму (Habitat in pinetis supra pag. Nikita): «Нікітська яйла, М. Біберштейн (Herb. M. B.); підъем на Нікітську яйлу от дер. Нікіта, в сосновом лесу, 15.07.1946, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крима, № 83); там же, 15.07.1946, он же (Раст. Крима, № 431, 432, 434)» (за протологом).

Typus: «Подъем на Никитскую яйлу от дер. Никита, в сосновом лесу. — In pineto (*P. pallasiana*) supra pag. Nikita, 15.08.1946, № 434 (Раст. Крима). S. Juzepczuk» (*LE*, lectotypus: L. Krssovskaja, 2000, in herb. sector europ.).

Примітка. На гербарному аркуші, екземпляр якого Л. Красовська обра-ла за лектотип, як дата збору помилково вказано восьмий місяць (08). Од-нак за лектотип доцільніше було б обрати перший цитований у протолозі екземпляр, який зберігається в колекції Біберштейна, оскільки саме цей зразок (зібраний Біберштейном) послужив основою назви виду.

— У соснових лісах, на яйлах у Гірському Криму. Ендемік.

9. *R. moestifrons* Juz. 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 97; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 41; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 226, pro hybr. *R. caesius* L. x *R. sp.*

Вид описано з Криму (Habitat in litore meridionali Tauriae circa opp. Jaltam): «Близ г. Ялты, по Ауткинському шоссе, 22.07.1935, незр. пл., С. Юзепчук (Pl. taur. select., № 325)» (за протологом).

Typus: «Близ г. Ялты, по Ауткинському шоссе, 22.07.1935, незр. пл., С. Юзепчук (Pl. taur. select., № 325)» (*LE*, holotypus, in herb. sector europ.).

— У соснових лісах, біля доріг в Гірському Криму. Ендемік.

10. *R. nanitauricus* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 91; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 42; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 227, pro hybr. *R. tauricus* Schlecht. ex Juz. x *R. tomentosus* Borkh.; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укра.: 163, pro hybr. *R. tauricus* x *R. tomentosus*.

Вид описано з Криму (Habitat ad margines silvarum frondosarum et vierum): «Кримский Государственный заповедник, в лесу на подъеме от пер. Кебит-богаз к поляне Узун-алан, 24.07.1946, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 238)» (за протологом).

Typus: «Кримский Государственный заповедник, в лесу на подъеме от пер. Кебит-богаз к поляне Узун-алан, 24.07.1946, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 238)» (*LE*, holotypus, in herb. sector europ.).

Примітка. За формою листочків і характером їх зубчиків нагадує *R. tauricus*.

— На узліссях в Гірському Криму. Ендемік.

11. *R. oenoxylon* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленинград), 13: 96; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 41.

Вид описано з Криму (Habitat in pinetis supra opp. Jalta, plerumque ad margines silvarum et viarum): «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, у

шоссе, 02.08.1946, отцв., незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 275)» (за протологом).

Типис: «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, у шоссе, 02.08.1946, отцв., незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 275)» (*LE*, holotypus, in herb. sector europ.).

Примітка. Вид, ймовірно, гібридогенного походження (*R. tauricus* x *R. tomentosus*).

— У соснових лісах, на узліссях, біля доріг в Гірському Криму. Ендемік.

12. *R. oligacanthus* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 3: 178.

Вид описано з Криму: «In sylva elata inter Aiwasil et Stili» (за протологом).

Типис: «In Hohen. walde ueber Aiwasil gegen Aili» (*H*, holotypus ?).

Примітка. Забутий вид, у літературі не цитується навіть в синоніміці, таксономічний статус не з'ясований.

13. *R. paratauricus* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 90; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 38; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 227; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163.

Вид описано з Криму [Habitat in pinetis litoris meridionalis, locis praeasertium plus minus apricis]: «На спуске с горы Ай-Петри, у Учан-су, 02.08.1946, пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 304)» (за протологом).

Типис: «На спуске с горы Ай-Петри, у Учан-су, 02.08.1946, пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 304)» (*LE*, holotypus, in herb. sector europ.).

— У соснових лісах, на відкритих місцях в Гірському Криму. Ендемік.

14. *R. scenoreinus* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 106; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 43; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 226; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163.

Вид описано з Криму [Habitat in silvis frondosis (imprimis in querctis) Tauriae montanae (declivia septentrionalia)]: «Крымский Государственный заповедник, в лиственном лесу на подъеме от пер. Кебит-богаз к поляне Узун-алан, 06.08.1948, цв., отцв., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 1109)» (за протологом).

Типис: «Крымский Государственный заповедник, в лиственном лесу на подъеме от пер. Кебит-богаз к поляне Узун-алан, 06.08.1948, цв., отцв., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 1109)» (*LE*, holotypus, in herb. sector europ.).

Примітка. Не виключено, що вид гібридогенного походження, в його утворенні, ймовірно, брав участь *R. tomentosus*. Габітуально нагадує кавказькі види спорідненості *R. ponticus* Juz. (секція *Glandulosi*).

— На галевинах у Гірському Криму. Ендемік.

15. *R. stenophyllum* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 92; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 41; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 227, pro hybr. *R. tauricus* Schlecht. ex Juz. x *R. tomentosus* Borkh.; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163, pro hybr. *R. tauricus* x *R. tomentosus*.

Вид описано з Криму (Habitat in silvis litoris meridionalis Tauriae): «На спуске с горы Ай-Петри, между Пендикулем и Учан-су, 22.07.1935, цв., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 321) (за протологом).

Typus: «На спуске с горы Ай-Петри, между Пендикулем и Учан-су, 22.07.1935, цв., С. Юзепчук. — In descensu a m. Ai-Petri, inter praesidia Pendikul et Utschan-Su, 22.07.1935, S. Juzepczuk (Pl. taur. select., N 321)» (LE, holotypus, in herb. sector europ.).

— У змішаних і соснових лісах Гірського Криму. Ендемік.

16. *R. stevenii* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 102; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 42.

Вид описано з Криму (Habitat in silvis declivium septentrionalium et imprimis meridionalium Tauriae montanae, locis plerumque excisis et ad margines viarum): «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, у шоссе, 02.08.1946, С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 272)» (за протологом).

Typus: «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, у шоссе, 02.08.1946, С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 272)» (LE, holotypus, in herb. sector europ.).

— У соснових і змішаних лісах, на гаяльвинах, біля доріг в Гірському Криму. Ендемік.

17. *R. subtauricus* Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 98; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 39; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163, про hybr. *R. taureus* Schlecht. ex Juz. x *R. tomentosus* Borkh.

Вид описано з Криму (Habitat in pinetis supra opp. Jalta, praesertim ad eorum margines et ad vias): «На спуске с горы Ай-Петри, в сосновом лесу бл. Пендикуля, 22.07.1935, отцв., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 312)» (за протологом).

Typus: «На спуске с горы Ай-Петри, в сосновом лесу бл. Пендикуля, 22.VII.1935, отцв., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 312)» (LE, holotypus, in herb. sector europ.).

— У соснових і змішаних лісах, на узліссях, біля доріг в Гірському Криму. Ендемік.

18. *R. taureus* Schlecht. [ex Ledeb., 1844, Fl. Ross., 2, 1: 68, pro syn.; Юзепчук, 1941, Фл. СССР, 10: 29, pro syn.] ex Juz., 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 88; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 38; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 227; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163. — *R. candicans* auct., non Weihe: Юзепчук, 1941, Фл. СССР, 10: 29, р. р.

Вид описано з Криму (Habitat in declivibus apricis, ad margines silvarum et viarum, ad sepes, ad rivos et rivulos Tauriae (montanae)) (за протологом).

Typus: ? «*Hortus Botanicus Nikitiensis*, in via a Museo ad introitum principalem (sponte), 07.1935, N 236, S. Juzepchuk» (JALT, lectotypus, isolectotypus: L. Krassovskaja, 2001).

Примітка. За лектотипом Л. Красовська обрала екземпляр, зібраний С. Юзепчуком (цит. пр.: 90), який зберігається в гербарії Нікітського бота-

нічного саду. Але цей екземпляр не може бути лектотипом, оскільки, як пише Юзепчук (1950, цит. пр.: 88), він бачив автентичний екземпляр у гербарії Берлінського ботанічного саду. К. Ледебур (цит. пр.: 68) також посилається на даний гербарний екземпляр, цитуючи *R. tauricus* як синонім *R. fruticosa* L.: «*R. tauricus* Schechtend., in herb. reg. berol.».

— На відкритих схилах, по берегах річок, узліссях, біля доріг в Гірському Криму і на Керченському півострові. Ендемік Криму. Один із найпоширеніших у Криму видів роду *Rubus*. Найближче стойть до видів кавказької групи *Hedycarpus* Focke. Перспективна ягідна культура.

19. *R. troitzkyi* Juz. [1941, Фл. СССР, 10: 31, nom. nud.] 1950, Ботан. мат-ли (Ленінград), 13: 105; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 2: 42; Шалыт, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 227; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163.

Вид описано з Криму (Habitat in declivibus septentrionalibus jugi Jaila, ad margines silvarum et viarum): «Крымский Государственный заповедник, близ Биологической станции, по дороге к Чучельскому пер., 18.07.1935, цв., отцв., незр. пл., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 265)» (за протологом).

Типус: «Крымский Государственный заповедник, близ Биологической станции, по дороге к Чучельскому пер., 18.07.1935, цв., отцв., незр. пл., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 265)» (LE, holotypus, in herb. sector europ.).

— На узліссях, біля доріг в Гірському Криму. Ендемік.

Примітка. Добре окреслений вид, який, за автором, займає проміжне місце між групами *Discolores* i *Glandulosi*.

20. *R. undabundus* Juz. [1941, Фл. СССР, 10: 31, nom. nud.] 1950, Ботан. мат-ли (Ленінград), 13: 94; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 2: 41; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163, pro hybr. *R. tauricus* Schlecht. ex Juz. x *R. tomentosus* Borkh.

Вид описано з Криму (Habitat in marginibus silvarum et viarum in decliv. septentr. jugi Jaila (in ditione Reservati Publici)): «Крымский Государственный заповедник, близ Биологической станции, возле кладбища, 18.07.1935, цв., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 256)» (за протологом).

Типус: «Крымский Государственный заповедник, близ Биологической станции, возле кладбища, 18.07.1935, цв., С. Юзепчук (Pl. taur. select., N 256)» (LE, holotypus, in herb. sector europ.).

— На узліссях, вирубках, біля доріг у Гірському Криму. Ендемік.

21. *R. utshansuensis* Juz., 1950, Ботан. мат-ли (Ленінград), 13: 93; Юзепчук, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 2: 41; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 163, pro hybr. *R. tauricus* Schlecht. ex Juz. x *R. tomentosus* Borkh.

Вид описано з Криму (Habitat in litore meridionali Tauriae, supra opp. Jalta): «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, у водопада Учан-су, на осинах, 10.07.1946, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 13)» (за протологом).

Typus: «На спуске с горы Ай-Петри к Пендикулю, у водопада Учан-су, на осыпях, 10.07.1946, незр. пл., С. Юзепчук (Раст. Крыма, № 13)» (*LE*, holotypus, in herb. sector europ.).

— На узліссях соснових лісів та щебенистих схилах у Гірському Криму.
Ендемік.

Рекомендує до друку С.Л. Мосякін Надійшла 29.03.2001

Н.М. Федорончук

Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, г. Киев

ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ОПИСАННЫЕ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И ИХ ТИПИФИКАЦИЯ: СЕМЕЙСТВО ROSACEAE JUSS. (РОД *RUBUS* L.)

В алфавитном порядке приведен список видов (21) рода *Rubus* L. (*Rosaceae* Juss.), описанных с территории Украины. Почти все они (20) описаны С. Юзепчуком в Горном Крыму. Сюда включены и виды, которые в настоящее время рассматриваются в качестве синонимов. Для каждого из них приводится литературная цитата, основная синонимика, номенклатурный тип и место его хранения. Для таксонов признанных самостоятельными видами, даны эколого-ценотические характеристики и указано распространение. Кроме того, примечания к некоторым критическим видам содержат номенклатурные и таксономические комментарии.

M.M. Fedorovichuk

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

SPECIES OF VASCULAR PLANTS DESCRIBED FROM THE TERRITORY OF UKRAINE, AND THEIR TYPIFICATION: THE FAMILIA ROSACEAE JUSS. (GENUS *RUBUS* L.)

The list of species of genus *Rubus* L. (Rosaceae Juss.) described from the territory of Ukraine, incl. Crimea, is presented. Typification were carried out on the base of the analysis of protologs and study of authentic herbarium material. Literature citations, basionym, type and place of keeping, ecological and chorological peculiarities and new taxonomical information are presented for each species.