

М.М. ФЕДОРОНЧУК

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Вул. Терещенківська, 2, Київ, 01601, Україна
syst@botany.kiev.ua

**ВИДИ СУДИННИХ РОСЛИН,
ОПИСАНИХ З ТЕРТОРІЇ УКРАЇНИ,
ЇХ ТИПІФІКАЦІЯ ТА КРИТИЧНИЙ
АНАЛІЗ: РОДИNA APIACEAE LINDL.
(РОДИ SANICULA L. — TRINIA HOFFM.)**

Ключові слова: вид, тип, Apiaceae, типіфікація, таксономія, номенклатурна комбінація, поширення, еколого-ценотичні особливості, Україна

У даній статті ми завершуємо публікацію повного списку видів родини зонтичних (*Apiaceae Lindl.*), описаних з території України (роди *Sanicula* L. — *Trinia Hoffm.*). Для всіх видів (у тому числі й тих, які тепер приймаються за синоніми) ми вказуємо літературну цитату, основну синоніміку, місце опису, тип (голотип, лектотип) та місце його зберігання, а для деяких критичних таксонів наводимо також свої міркування щодо їх таксономічного статусу. Для тих видів, які нині визнані самостійними, вказуються також їхні еколого-ценотичні особливості та характер поширення в Україні. Список видів (і родів) наводиться в алфавітному порядку.

***SANICULA* L.**

1. *S. crithmifolia* Willd. 1801, Neue Schrift. d. Ges. Naturf. Freund. in Berlin, 3: 419; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 358, pro syn. *Rumia crithmifolia* (Willd.) Koso-Pol.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 350, pro syn. *R. crithmifolia*.

Вид описано з Криму: «Wächst in Taurien» (за протологом).

Typus: голотип зберігається в гербарії Вільденнова (B) під номером 5617.

— На сухих кам'янистих схилах, відслоненнях вапняку у передгір'ї і на Південному березі Криму.

***SCANDIX* L.**

1. *S. falcatata* Lond. 1806, Mem. Soc. Nat. Mosc., 1: 57; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 145; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 431, pro syn. *S. australis* L.

Вид описано з Криму: «in Tauria frequens» (за протологом).

Typus: лектотип зберігається у Москві (MW).

2. *S. taurica* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Mosc., 29, 4: 355; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 3: 166; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 229. — *S. falcatata* auct., non Lond.: Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 145, p.p.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 431, pro syn. *S. australis* L.

Вид описано з Криму: «In valle Laspi» (за протологом).

Typus: ?

На сухих схилах у Криму.

Примітка. У гербарії LE автентичний матеріал *S. taurica* Steven відсутній. Імовірно, він зберігається у гербарії H.

SELINUM L.

1. *S. intermedium* Besser, 1809, Prim. Fl. Galic., 1: 205; Шишк., 1951, Фл. ССРС, 17: 201, pro syn. *Peucedanum palustre* (L.) Moench.

Вид описано з околиць Львова: «Leopoli in sylvae Krzywczycensis frutiosus versus pagum» (за протологом).

Typus: «(*Thyselinum*) *Selinum intermedium*. Prim. Fl. Gal. Leopoli semel. a me lectam. Herb. W. Besser» (KW, lectotypus: Fedorochuk, hoc loco).

Примітка. Типовий екземпляр (лектотип) зберігається у колекції Бессера в пачці під № 191.

2. *S. podolicum* Besser, 1809, Prim. Fl. Galic., 1: 393 (in Addenda); id. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 12 («*Oreoselinum podolicum*»); Шишк., 1951, Фл. ССРС, 17: 195, pro syn. *Peucedanum podolicum* (Besser) Eichw.; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 593, pro syn. *P. podolicum*; Tutin, 1968, Fl. Europ., 2: 362, pro syn. *P. carvifolia* Vill.; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Українського Полісся та Карпат: 237, pro syn. *P. carvifolia* Vill.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 394, pro syn. *P. carvifolia*. — *Oreoselinum podolicum* (Besser) M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 210, in nota, sine auct. comb.

Вид описано з околиць Заліщик (Тернопільська обл.): «Circa Zaleszczyki et copiosius ad huc circa Kamieniec Podolski in Podolia rossica legit DF.» (за протологом).

Typus: «*Selinum podolicum*. Prim. Fl. Gal. Herb. W. Besser» (KW, lectotypus: Fedorochuk, hoc loco).

Примітка. У гербарній колекції Бессера (пачка № 110), крім цитованого екземпляра, зберігається ще один зразок, але визнати його за автентичний не можна, оскільки він зібраний значно пізніше, ніж уперше було описано вид: «*Oreosel. podol.* VIII.21» (етикуетка написана олівцем і не рукою Бессера).

— На лісових галевинах, серед кущів у Лісостепу, рідше — у Степу.

3. *S. schiwereckii* Besser, 1809, Prim. Fl. Galic., 1: 205; id. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 12 («*Thyselinum schiwereckii*»); Шишк., 1951, Фл. ССРС, 17: 201, pro syn. *Peucedanum palustre* (L.) Moench; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 589, pro syn. *Calestania palustris* (L.) Koso-Pol.; він же, 1987, Опред. высш. раст. Українського Полісся та Карпат: 237, pro syn. *Peucedanum palustre* (L.) Moench.

Вид описано з околиць Львова: «Leopoli in sylva Betularum extra fontem Martiale Dni Kratter versus S-W et in fruticeto inter Sknilow et Nawaria» (за протологом).

Typus: «E Galicia [fr.]» (KW, lectotypus: Fedorochuk, hoc loco).

Примітка. Цитований автентичний екземпляр (лектотип) зберігається у колекції Бессера у пачці під № 191. Тут же є ще два автентики з визначенням самого Бессера: «*Selinum schiwereckii*. Prim. E Galic. (fr.) et Volhyn.».

SESELI L.

1. *S. arenarium* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 242, in adnot.; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 501; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 551; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 3: 195; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 353; Пименов, 1978, Нов. системат. высш. раст.: 194, pro syn. *S. tortuosum* L.; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234, pro syn. *S. tortuosum*; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 370, pro syn. *S. tortuosum*.

Вид описано з України: «Ucrainiae» (за протологом).

Typus: «In arenis mobili, haud procul Sorotschenci. Rossia a. 1815» (LE, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco; Menitzky, 1990, in herb. caucas. sector).

Примітка. У колекції Бессера (KW) також зберігається автентик з визначенням Біберштейна: «*Seseli arenarium* mihi. Ex Russia minoris silvis arenosis [...]».

— На пісках у Степу, здебільшого по р. Дніпру.

2. *S. campestre* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 44; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 499; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 553; він же, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ., 2: 450; Пименов, 1978, Нов. системат. высш. раст.: 194, pro syn. *S. tortuosum* L.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 370, pro syn. *S. tortuosum*.

Вид описано з Поділля: «In campestribus inter Sawran et Krasnenki. Andrz.» (за протологом).

Typus: «E Podol. austr.» (KW, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco).

— На чорноземах, у степах, на кам'истих ділянках у Лісостепу, Донецькому Лісостепу та Степу.

3. *S. dichotomum* Pall. ex M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 235; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 514, cum auct. Pall.; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 3: 193, cum auct. Pall.; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 352; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 370.

Вид описано з Криму: «in Tauriae collibus calcareis» (за протологом).

Typus: «Ex Tauria» (LE, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco; Byalt, 1993, in herb. caucas. sector).

Примітка. У гербарній колекції Бессера (KW) зберігається екземпляр (автентик?) з етикеткою, написаною С. Палласом: «*Seseli dichotomum*. Taur.».

— На сухих урвищах і схилах, кам'истих ділянках, у лісах Гірського Криму.

4. *S. gummiferum* Pall. ex Smith, 1807, Exot. Bot., 2: 121, tab. 120; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 497, cum auct. Pall.; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 3: 193, cum auct. Pall.; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ., 2: 335; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 352; Пименов, 1978, Нов. системат. высш. раст.: 195; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 371.

Вид описаний за культивованими у Великій Британії рослинами, вирощеними з насіння, завезеного з Криму: «Mr. Lembert's garden, Boyton, aug. 1806» (за протологом).

Typus: ? (BM).

— На схилах і кам'янистих відслоненнях у Криму.

5. *S. lehmannii* Degen, 1898, Osterr. Bot. Zeitschr., 48: 121; Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 498 (неточне цитув.); Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 3: 194; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 352; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 371.

Вид описано з Криму: «in Tauria. In cacumine montis Ai Petri prope Jaltam, VIII.1898, K.B. Lehmann» (за протологом).

Typus: ? (BP).

— На вапняках у Гірському Криму (на яйлах).

6. *S. pauciradiatum* Schischk. 1950, Фл. ССР, 16: 500; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крыма: 353; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 3: 195, pro syn. *S. arenarium* M. Bieb.; Тамамшян, 1967, в Гросгейм, Фл. Кавк., изд. 2-е, 7: 92, pro syn. *S. tortuosum* L. var. *pauciradiatum* (Schischk.) Tamamsch.; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ., 2: 337, pro syn. *S. tortuosum*; Пименов, 1978, Нов. системат. высш. раст.: 194, pro syn. *S. tortuosum*.

Вид описано з Криму: «Tauria meridionalis. In jugo Karadagh, in cacumine montis Karagacz. Fl. 20.IX.1928. A. Krystofovicz» (за протологом).

Typus: «г. Карадаг, вершина горы Карагач. 20.IX.1928. Собр. А. Криштофович» (LE, holotypus, isotypus).

— На кам'янистих і глинистих схилах Гірського та Степового Криму.

7. *S. petraeum* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 235.

Вид описано з Кавказу і Криму?: «Habitat in saxosis Caucasi subalpini et in Tauria tarijus» (за протологом).

Typus: «Ex Caucaso Cabardinico» (LE, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco; Byalt, 1993, in herb. caucas. sector).

Примітка. Маршалл Біберштейн, як видно із цитованого протологу, зазначає, що вид, окрім Кавказу, зростає також у Криму. Але, мабуть, Крим вказано помилково, оскільки *S. petraeum* — суперечко Кавказький вид.

8. *S. peucedanifolium* (Spreng.) Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 44, sine auct. Spreng.; Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 502; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 555; він же, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234, pro syn. *S. peucedanifolium* (Spreng.) Besser; Пименов, 1978, Нов. системат. высш. раст.: 194, pro syn. *S. tortuosum* L.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 370. — *Bubon peucedanifolius* Spreng. 1819, Syst. Pl., 1: 900.

Вид описано з Поділля і Чехії: «Podolia, Bannatus» (за протологом).

Typus: «In En. Pl. Volh. e Podol. austr. Herb. W. Besser» (LE, isolectotypus?: Fedoronchuk, hoc loco; Vinogradova, 1995, in herb. europ. sector, pro «isotypus»).

Примітка. У гербарії LE є лише один вищепіданий автентичний екземпляр, який В. Виноградова (під сумнівом) прийняла за ізотип. Але оскільки базіонімом *Seseli peucedanifolium* (Spreng.) Besser є *Bubon peucedanifolium* Spreng, то лектотипом слід вважати типовий екземпляр з гербарію В, на якому

базується опис шпренгелівського виду. Його дублікат доцільніше було б обрати з автентичних зразків, що зберігаються в колекції Бессера (*KW*) на п'яти гербарних аркушах з визначенням: 1. «*Seseli rigidum* K.E Bannatu»; 2. «*Bubon peucedanifolium* (Pannon)»; 3. «*Seseli rigidum* W.K. Rchb. Germ. Exc. 3018. Bannat, kalkfelsen bei Csiklova. Dr. Wierzbicki (№ 1558)»; 4. «*Seseli peucedanifolium* mihi. Cum varies. E Podol. austr.»; 5. «*Seseli rigidum* W. et K. S. *peucedanifolium* mihi. E Podol. austr. Andrz.».

— На кам'янистих схилах по Дністру і його притоках в Одеській обл.
9. *S. tauricum* Link. ex Spreng. 1825, Syst. Veg., 1: 884; Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 491, pro syn. *S. varium* Trev.

Вид описано з Криму: «Tauria» (за протологом).

Typus: ?

10. *S. tenderiense* Kotov, 1955, Фл. УРСР, 7: 636, 555; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 234; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ., 2: 450, pro syn. *S. campestre* Besser; Пименов, 1978, Нов. системат. высш. раст.: 194, pro syn. *S. tortuosum* L.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 370, pro syn. *S. tortuosum*.

Вид описано з острова Тендер (Херсонська обл.): «RSS Ukr., dit. Chersonensis, distr. Golopristaniensis, peninsula Tender (Tendra), 6.IX.1933, legit. A. Prjanischnikow» (за протологом).

Typus: «*Seseli arenarium* M.B. Херсонский окр. (раньше Днепровский уезд Таврич. г.), остров Тендер. 6.IX.1925. А. Прянишников» (*KW*, holotypus?).

Примітка. Як засвідчує цитований зразок, рік збору не збігається із зазначеним у протолозі. Не виключено, що в протолозі допущена друкарська помилка, оскільки на цитованому екземплярі рукою автора виду — М. Котова — написано: «*Seseli tenderiense* Kotov. Typus. Sp. nova, 27.X.1951, M. Котов». Такі ж notae criticae Котова є ще на двох гербарних зразках, зібраних з коси Тендер, але колектори цих зразків — Н. Шостенко і Ф. Левіна (дати збору, відповідно: 9.VII.1926 та 20.VII.1929). Їх ми приймаємо за паратипи. Інших автентичних зразків, де б колектором значився А. Прянишников, у гербаріях *KW* і *LE* не виявлено.

— На приморських пісках, галечниках і ракушняках по берегах Чорного й Азовського морів.

SILAUM Bernh.

1. *S. besseri* DC. 1830, Prodr., 4: 161; Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 546; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 570; він же, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 235, pro syn. *Silaum alpestre* (L.) Thell.; Tutin, 1968, Fl. Europ., 2: 342, pro syn. *S. silaus* (L.) Schinz. et Thell.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 378, pro syn. *S. silaus*.

Вид описано з Південного Поділля: «in campis apricis Podoliae australis ex Besser» (за протологом).

Typus: «Podol.» (*KW*, isolectotypus?: Fedorovichuk, hoc loco).

Примітка. Не виключено, що обраний нами за ізолектотип екземпляр був надісланий Бессеру автором виду — Декандолем (почерк на етикетці нагадує

декандольівський). Декандоль описав його на основі виділеного Бессером, але не описаного ним *Silaus alpestris*, кілька екземплярів якого під такою ж назвою «*Silaus alpestris* mihi. *Peucedanum. E Podol. austr. campis. Herb. W. Besser.*» зберігаються у колекції Бессера (*KW*). Оскільки остання назва вже існувала (*Silaus alpestris* L.), Декандоль, описуючи новий вид, перейменував його.

— На солонцоватих луках, солончаках, у Степу, рідше — у південній частині Лісостепу.

***SIUM* L.**

1. *S. lancifolium* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 230, non Schrank (1789); Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 463, pro syn. *S. sisaroides* DC.; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 545, pro syn. *S. sisaroides*; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 370, pro syn. *S. sisarum* L.

Вид описано з Криму: «per Rossiam australiorem, usque in Ucrainiam...» (за протологом).

Typus: «Tanain. Henning, a. 1816» (*LE*, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco, in herb. caucas. sector).

Примітка. У колекції М. Біберштейна (*LE*), крім цитованого екземпляра, обраного нами за лектотип, зберігаються ще три автентичні зразки: «*Sium latifolium*. Grischkova a. 1816», «*Sium latifolium*. Umbellae seminiferae. Grischkova a. 1815», «*Sium latifolium* varietes? Taschanu stagno a. 1815».

2. *S. podolicum* Besser ex Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 479; Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 463, pro syn. *S. sisaroides* DC.; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 545, pro syn. *S. sisaroides*.

Вид описано на основі бессерівських зразків, але у протолозі його місце-зростання не наводиться, є лише посилання на виділений Бессером вид «*S. podolicum* Bess.».

Typus: ?

Примітка. У колекції Бессера (*KW*), а також у гербарії *LE* дублікати автентичних зразків відсутні (оригінали, ймовірно, знаходяться у гербарії *B*).

***SMYRNIUM* L.**

1. *S. nudicaule* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 1: 238; Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 223, pro syn. *Danaa nudicaulis* (M. Bieb.) Grossh.; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 508, pro syn. *D. nudicaulis*; Tutin, 1968, Fl. Europ., 2: 342, pro syn. *Physospermum cornubiense* (L.) DC.; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 230, pro syn. *Ph. cornubiense*; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 416, pro syn. *Ph. cornubiense*.

Вид описано з Криму і Кавказу: «In sylvis Tauriae Caucasiique inter frutices reperitur» (за протологом).

Typus: «*Ligusticum lobili*. Ex Tauria et Caucaso. *Smirnium nudicaule* M.» (*LE*, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco; Byalt, 1993, in herb. caucas. sector).

— У лісах, серед чагарників у Донецькому степу та Гірському Криму.

***TORILIS* Adams.**

1. *T. microcarpa* Andr. ex Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 44, sine auct. Andr.; Шишк., 1950, Фл. ССР, 16: 156, pro syn. *T. ucranica* Spreng.; Котов,

1955, Фл. УРСР, 7: 498, про syn. *T. ucranica*; він же, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 229, про syn. *T. ucrainica*; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 433, про syn. *T. ucrainica*.

Вид описано з Південного Поділля: «In Pod. austr. Andrz.» (за протологом).

Typus: «E Podol. austr. ad [...] Hypanu» (KW, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco).

Примітка. У колекції Бессера (КИ) зберігаються автентичні зразки, які змонтовані на п'яти гербарних аркушах. На одному з них, обраному нами за лектотип, є вищечитована етикетка.

2. *T. ucranica* Spreng. 1820, in Schult. Syst. Veget., 6: 485; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 156; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 498, він же, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 229; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 433.

Вид описано з України: «In Ucrania. Besser» (за протологом).

Typus: ?

Примітка. У колекції Бессера (КИ), а також у гербарії LE автентичні зразки (дублікати) відсутні. Ймовірно, вони зберігаються у гербарії В.

— У дубових лісах, на узліссях, серед чагарників, на відкритих схилах у південно-західній частині України та на Лівобережжі (Запорізька і Херсонська області).

***TRAGIUM* (Spreng.) Rchb.**

1. *T. tauricum* Ledeb. 1819, Ind. Sem. Hort. Dorpat; Link, 1819, Enum. Pl. Hort. Berol., 1: 286; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 441, про syn. *Pimpinella taurica* (Ledeb.) Steud.; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 3: 189, про syn. *P. taurica*; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крима: 351 про syn. *P. taurica*; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 233, про syn. *P. peregrina* L.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 433, про syn. *P. peregrina*.

Вид описано з Криму, але у протолозі місцезростання не вказане: («Наб. ...»).

Typus: «Herb. Ledeb. 1.17.8. e Taur. 23.VII.» (LE, syntypi: Fedoronchuk, hoc loco).

— На кам'янистих і сухих схилах, серед виноградників, у садах, злебільшого на Південному березі Криму.

***TRINIA* Hoffm.**

1. *T. biebersteinii* Fedoronchuk, 1978, Ботан. журн. 63, 4: 613; Федорончук, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 232. — *T. kitaibelii* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 246, quoad pl. taur.; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 357, quoad pl. taur.; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 3: 184; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 349.

Вид описано з Криму (Гірський Крим, яйла): «In Tauria, legit compere acc. a D. Prescott, 1832» (за протологом).

Typus: «*Rumia leiogona*. In Tauria, legit compere acc. a D. Prescott, 1832» (LE, holotypus, in herb. europ. sector).

— На кам'янистих, дрібноземних схилах у Гірському Криму.

2. *T. hoffmannii* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 244, р.р.; Шишк., 1950, Фл. УРСР, 16: 355, pro syn. *T. hispida* Hoffm.; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 528, pro syn. *T. hispida*; Федорончук, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 232, pro syn. *T. hispida*; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 349, pro syn. *T. hispida*.

Вид описано з території колишньої Російської імперії «Південної Росії»: «In campis apricis frequens» (за протологом).

Typus: «*Trinia hispida*. Quae *Pimp. dioica*, Fl. t. c. Ex tanaiceoribus [...] 1816» (LE, lectotypus: Fedoronchuk, hoc loco, in herb. caucas. sector).

Примітка. Вищенаведена цитата з протологу стосується *Pimpinella dioica*, за яку Біберштейн прийняв (у першому томі цитованої праці) *Trinia hoffmannii*, про що він вказує у синонімії даного виду.

3. *T. kitaibelii* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 246, quoad pl. volhyn.; Федорончук, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 232. — *T. ucrainica* Schischk. 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 158; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 357; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 3: 184; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крима: 347; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 349.

Вид описано з околиць Кременя (Тернопільська обл.): «... circa Cremenetium Volhyniae, Besser» (за протологом).

Typus: «*Pimpinella glauca*. Krzemenc.» (LE, lectotypus; KW, isolectotypus: Fedoronchuk, hoc loco).

— На схилах, сухих луках, узліссях у лісостеповій і степовій частинах України.

4. *T. stankovii* Schischk. 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 159; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 352; Станков, 1953, в Е. Вульф, Фл. Крима, 2, 3: 184; Чернова, 1972, Опред. высш. раст. Крима: 348; Федорончук, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 232, pro syn. *T. glauca* (L.) Dumort.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 348, pro syn. *T. glauca*.

Вид описано з Криму: «Tauria, mons Salamijar. Fl. 17.VI.1897 et fr. 5.VII.1897, K. Golde» (за протологом).

Typus: «*Trinia henningii* Hoffm. Крим, горы Саламляр, на каменистом склоне, 23.VI.1897. Собр. K. Golde» (LE, holotypus?, isotypus?).

Примітка. У гербарії LE (колекція типів європейського сектора) є лише два зразки, які В. Виноградова (1994, in herb.) визначила як голотип та ізотип, але вони не відповідають даті збору, вказаній у протолозі (не виключено, що дата збору в протолозі вказана помилкова). Ще п'ять екземплярів, зібраних з того ж місця, слід віднести до топотипів.

— На сухих схилах у Криму.

5. *T. ucrainica* Schischk. 1950, Ботан. мат-лы (Ленінград), 13: 158; Шишк., 1950, Фл. СССР, 16: 351; Котов, 1955, Фл. УРСР, 7: 524; Федорончук, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 232, pro syn. *T. kitaibelii* M. Bieb.; Виноградова, 2004, Фл. Вост. Евр., 11: 349, pro syn. *T. kitaibelii*.

Вид описано з Поділля: «Ucraina, prov. Vinnitsa, in pratis stepposis non procul ab oppid. Jampol (fr.) 25.VII.1853, A. Rogovicz» (за протологом).

Тип: «Подольская губерн., недалеко Ямполя, на целинном месте, 25.VII.1853, A. Рогович» (*LE*, holotype, in herb. europ. sector; *KW*, isotypus).

Рекомендує до друку
С.Л. Мосякін

Надійшла 21.10.2002

H.M. Федорончук

Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного
НАН України, г. Київ

**ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ОПИСАННЫХ
С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ИХ ТИПИФИКАЦИЯ
И КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: СЕМЕЙСТВО APIACEAE LINDL.
(РОДЫ SANICULA L. – TRINIA HOFFM.)**

В данной статье завершен перечень видов Apiaceae Lindl. (роды *Sanicula* L. – *Trinia* Hoffm.), описанных с территории Украины и пограничных районов (сюда включены и те виды, которые сейчас рассматриваются в качестве синонимов). Для каждого из них приведены литературная цитата, основная синонимика, номенклатурный тип и место его хранения. Для тех таксонов, которые в настоящее время признаны самостоятельными видами, также представлены их эколого-ценотические характеристики та особенности распространения на территории Украины. Описания некоторых критических видов дополнены номенклатурными и таксономическими комментариями.

Ключевые слова: вид, тип, Apiaceae, типификация, таксономия, номенклатурная комбинация, распространение, эколого-ценотические особенности, Украина

M.M. Fedorochuk

M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

**SPECIES OF VASCULAR PLANTS DESCRIBED FROM
THE TERRITORY OF UKRAINE, THEIR TYPIFICATION
AND CRITICAL TAXONOMIC ANALYSIS: THE FAMIL
APIACEAE LINDL. (GENERA SANICULA L. – TRINIA HOFFM.)**

The list of species of Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss., genera *Sanicula* L. – *Trinia* Hoffm.) described from the territory of Ukraine, incl. Crimea, is presented. Typification were carried out on the base of the analysis of protologs and study of authentic herbarium material. Literature citations, basionym, type and place of keeping, ecological and chorological peculiarities and new taxonomical information are presented for each species.

Key words: species, type, Apiaceae, typification, taxonomy, nomenclatural combination, distribution, ecological coenotic features, Ukraine