



Н.М. ШИЯН, С.Л. МОСЯКІН,
О.М. КОРНІЄНКО, М.М. ФЕДОРОНЧУК
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська 2, м. Київ-1, 01601, Україна

**ТИПІФІКАЦІЯ ТАКСОНІВ РОДИНИ
ASTERACEAE ФЛОРИ УКРАЇНИ: РОДИ
ARTEMISIA L., *ASTER* L., *BARKHAUSIA*
MOENCH., *CARDUUS* L., *CARLINA* L.**

Ключові слова: тип виду, голотип, лектотип, ізотип,
Asteraceae, *Artemisia*, *Aster*, *Barkhausia*, *Carduus*, *Carlina*,
гербарій KW

У другій частині нашої публікації з типіфікації описаних з України видів родини *Asteraceae* подано інформацію про представників родів *Artemisia* L., *Aster* L., *Barkhausia* Moench., *Carduus* L. і *Carlina* L. Для кожного наведеного таксона вказано базионім, синоніміку, протолог за літературою, номенклатурний тип і місце його зберігання.

ARTEMISIA L.

1. *Artemisia argentata* Klokov, 1954, Ботан. мат-лы (Ленінград), 16: 364; Поляк. 1961, Фл. ССР, 26: 492, про syn. *A. caucasica* Willd.; Котов, 1965, Визн. рослин Ukr.: 687, про syn. *A. caucasica* Willd.; Леонова, 1969, в Е. Вульф, Фл. Крима, 3, 3: 214, про syn. *A. caucasica* Willd.; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. ССР, 7: 163, про syn. *A. caucasica* Willd.

За протологом: «RSS Ukr., dit. Staliniensis, distr. Strobesheviensis prope pag. Velikaja Karakuba, in decliviis calcareis ad fl. Kalmiuss, 18 VII 1931, G. Kleopov. — УССР, Сталінська обл., Старобешевський р-н, окр. с. Велика Каракуба, известковые склоны пор. Кальмиусу, 18 VII 1931, Ю. Клеопов».

Тип: «УССР, Мариупольский округ, село Великая Каракуба, известковые склоны по р. Кальмиус, 18 VII 1931, Ю. Клеопов» (*LE* s.n. — holotypus).

Примітка. У гербарії *KW* зберігаються три гербарні зразки *A. argentata* з locus classicus: «Надозів'я. Сталінська округа, с. В. Каракуба, вапнякові відслонення над р. Кальміусом, 27 VII 1925, Ю. Клеопов» (*KW* №№ 060320, 004994) та «Ukraina meridionalis, dit. Stalino, pag. Vel. Karakuba, in rupibus calcareis ad fl. Kalmiuss, 22 V 1927, G. Kleopow (*KW* № 067248). Кожен з них містить детермінанту, датовану 1958 р., з визначенням М. Клокова.

2. *Artemisia cretacea* Kotov, 1962, Фл. УРСР, **11:** 571, 347; Котов, Карнаух, Оперман, 1941, Дики корм. росл. Укр.: 205, descr. ucr.; Филат. 1984, Новости сист. высш. раст., **21:** 176, pro syn. *A. santonica* L.; Леонова, 1971, Новости сист. высш. раст., **7:** 284, pro syn. *A. nutans* Willd.; вона ж, 1987, цит. тв., **24:** 197, pro syn. *A. nutans* Willd.; Tutin, K. Persson, 1976, Fl. Europ., **4:** 182, pro syn. *A. nutans* Willd.; Котов, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 340, pro syn. *A. nutans* Willd.; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7:** 171, pro syn. *A. nutans* Willd.

За протологом: «RSS Ucr., dit. Luganskiensis, prope opp. Starobilsjk [sic!], in cretaceis ad fl. Ajdar (fl.), 16 X 1932, M. Kotov».

Тип: «Луганская обл., окр. г. Старобельска, меловые обнажения по правому б. р. Айдари, 16 X 1932, М. Котов» (*KW* № 04996 — holotypus; *LE* s.n. — sp. authent.: T. Leonova, in herb.).

3. *Artemisia dniproica* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11:** 556, 330; Котов, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 340; Цвелев, 1994. Фл. европ. ч. СССР, **7:** 165, pro syn. *A. campestris* L.

За протологом: «RSS Ucr., ditio Kiovensis, distr. Vyshcze-Dubecznensis, in pineneto ad pag. Lytki, 16 IX 1904, I. Selezhinskij».

Тип: «Растения Черниговской губернии. Летковское лесничество, Остёрского уезда, в сосновом лесу, в 34 кварт. на вырубке, 16 IX 1904, И. Сележинский» (*KW* № 004997 — holotypus).

4. *Artemisia dzevanovskyi* Leonova, 1969, в Е. Вульф, Фл. Крыма, **3:** 3: 222; Леонова, 1970, Новости сист. высш. раст., **6:** 198; Tutin, K. Persson, 1976, Fl. Europ., **4:** 181; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7:** 171; Филат. 1984, Новости сист. высш. раст., **21:** 168, pro syn. *A. lerchiana* Weber et Stechm.

За протологом: «RSS Ucr., Tauria, peninsula Tarchankut, 3—4 km ad austr.-orientaliter versus pag. Olenevka, in adruptis calcareis maritimis, 19 X 1966, N. Rubtzov et V. Kossych».

Тип: «Крым, Тарханкутский п-ов, в 3—4 км. от пос. Оленевка близ рыбзвода, на известняковых обрывах к морю, 19 X 1966, Н.М. Рубцов, В.М. Кожух» (*LE* s.n. — holotypus et isotypus).

5. *Artemisia elatior* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11:** 555, 319; Tutin, 1976, Fl. Europ., **4:** 183, pro syn. *A. abrotanum* L.; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7:** 159, pro syn. *A. abrotanum* L.

За протологом: «RSS Ucr., ditio Luganskiensis, distr. Cretaceus, reservatum steppae virgineae Strilezjkyj step dictum, in fossa steppacea, 01 IX 1956, Z. Sagyczeva».

Тип: «Луганська обл., Меловський р-н, зап. «Стрелецька степ», дно III балки, 01 IX 1956, Саричева З.А., Васильєва Е.Н.» (*KW* № 04998 — holotypus; *KW* №№ 004999, 005000 — sp. authent.).

Примітка. У протолозі пропущено прізвище другого колектора, оскільки на етикетці через брак місця воно було вписане навпроти пункту «*Det.*».

6. *Artemisia hololeuca* M. Bieb. ex Besser, 1834, *Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscou*, 3: 46; Поляк. 1961, Фл. ССР, 26: 457; Клоков, 1962, Фл. УРСР, 11: 325; Тутин, 1976, Fl. Europ., 4: 185; Цвєлев, 1994, Фл. європ. ч. ССР, 7: 163.

За протологом: «Colles cretacei ad fluvium Oskol et Donez in gub. Woronez et distr. Kupensk gub. Chark.».

Тип: «In cretaceis ad fl. Oskol, distr. Kupensk gub. Cherson, Herb. W. Besser» (*KW* № 067249 — lectotypus: N. Shiyan et al., *hoc loco*).

Примітка. У літературі є відомості про те, що тип зберігається у *LE*. Оскільки в *LE* такого зразка не знайдено, то за лектотип цього виду ми обрали зразок з колекції W. Besser (*KW*), зазначений у протолозі. Поряд з лектотипом на гербарному аркуші змонтовані ще два екземпляри цього виду з етикетками: «*Artemisia hololeuca* MB, ad fl. Oskol et Donez, M. Besser», «*Artemisia hololeuca* MB, colles cretacei ad fl. Oskol gubern. Woronez, odor [...]».

7. *Artemisia lanulosa* Klokov, 1962, Фл. УРСР, 11: 554, 313; Котов, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 340; він же, 1965, Визн. росл. Укр.: 687, pro syn. *A. caucasica* Willd.; Леонова, 1969, в Е. Вульф, Фл. Крима, 3, 3: 214, pro syn. *A. caucasica* Willd.; Цвєлев, 1994, Фл. європ. ч. ССР, 7: 163, pro syn. *A. caucasica* Willd.

За протологом: «RSS Ucr., Tauria montana orientalis, prope Stationem biologicam caradagensem, jugum vulcanicum Karagacz dictum, in rupestribus, 28 V 1948, M. Kотов et E. Karnauch».

Тип: «Крим, Судацький р-н, окр. Карадагської біологіческої станції, вулканіческий хребет Карагач. 28 V 1948, М. Котов і Е. Карнаух» (*KW* № 005003 — holotypus; *KW* № 005002 — isotypus; *KW* № 00504 — 005011 — sp. authent.).

8. *Artemisia marschalliana* Spreng. 1826, *Syst. Veg.*, 3: 496; Клоков, 1962, Фл. УРСР, 11: 328; Леонова, 1987, Новости сист. высш. раст., 24: 189; Цвєлев, 1994, Фл. європ. ч. ССР, 7: 166.

За протологом: «Volhynia, Besser. Hb. M.B.».

Тип: «Volhynia, Besser. Hb. M.B.» (*LE* s.n. — lectotypus: N. Tzvelev, 1994, in herb.).

Примітка. Статус вибраного за лектотип зразка з *LE* є сумнівним, оскільки немає впевненості, що саме його досліджував автор виду.

9. *Artemisia nutans* Willd. 1803, *Sp. Pl.*, 3, 3: 1831; Леонова, 1971, Новости сист. высш. раст., 7: 284; она же, 1987, цит. соч., 24: 197; Тутин, K. Persson, 1976, Fl. Europ., 4: 182; Котов, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 340; Котов, 1962, Фл. УРСР, 11: 571, 347, pro syn. *A. cretacea* Kotov; Поляк. 1961, Фл. ССР, 26: 574, pro syn. *A. amonogyna* Waldst. et Kit.; Филат. 1984, Новости сист. высш. раст., 21: 176, pro syn. *A. santonica* L.

За протологом: «E montibus cretaceis ad fluvium Donez».

Тип: «E montibus cretaceis ad fluvium Donez» (*LE* s.n. — lectotypus: N. Tzvelev, 1994, in herb.).

Примітка. Статус вибраного за лектотип зразка з *LE* є сумнівним, оскільки немає впевненості, що саме його досліджував автор виду.

10. *Artemisia praticola* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11**: 557, 345; Леонова в Е. Вульф, 1969, Фл. Крима, **3**, 3: 218, 360, pro syn. *A. santonica* L.; Tutin, K. Persson, 1976, Fl. Europ., **4**: 182, pro syn. *A. santonica* L.; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 171, pro syn. *A. santonica* L.

За протологом: «RSS Ukr., ditio Poltavica, distr. Kobeljakiensis, in salsulogineis pratosis ad fl. Vorsklo, 17 IX 1933, N. Bilyk».

Тип: «Друга тераса р. Ворскли. [С...] х. Грицаї, Кобеляцького р-ну, Харківської обл. 17 IX 1933, Г. Білик» (*LE* s.n. — holotypus).

Примітка. Тексти протологу й етикетки типового зразка не збігаються. На етикетці до цитованого зразка міститься примітка: «Typus speciei. 26 VI 1956 M. Klokov», тому ми вважаємо його голотипом. Пощукі іншого автентичного матеріалу у фондах *KW* виявилися марними.

11. *Artemisia × pseudofragrans* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11**: 557, 342; Tutin, K. Persson, 1976, Fl. Europ., **4**: 181, pro syn. *A. lerchiana* Weber ex Stechm.; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 170, pro syn. *A. lerchiana* Weber ex Stechm.

За протологом: «RSS Ukr., peninsula syvashca Czongar, in salsugineis, 8 X 1927, M. Kотов».

Тип: «Экспедиция по обследованию мелиофонда Мелитопольщины. Полуостров Чонгар вблизи ст. Чонгар «Белое поле» у ПП, № 5 дон, почва солонцеватая, 08 X 1927, М. Котов» (*KW* № 005017 — lectotypus: N. Shiyan et al. hoc loco (N. Shiyan, 27.02.2001, in herb.); *KW* № 005013 — isolectotypus: N. Shiyan et al. hoc loco (N. Shiyan, 27.02.2001, in herb.), *KW* №№ 005014 — 005016, 005018 — sp. authent.; *LE* s.n. — sp. authent.).

Примітка. За лектотип обрано зразок із двох наявних у *KW* дублетів з етикетками, що відповідають протологу, який містить більш ранню детермінанту з визначенням М. Клокова: «*A. x pseudofragrans* 21.12.1958», тоді як на іншому зразку є примітка, датована «23.01.1959». Інші автентичні зразки, зібрани з locus classicus, відрізняються датою та номером пробного майданчика збору (ПП). Крім того, у протозі автор наголошує на гібридогенному походженні виду (*A. boschniakiana* (Bess.) DC. x *A. taurica* Willd.).

12. *Artemisia tanaitica* Klokov, 1954, Ботан. мат-лы (Ленінград), **16**: 362, 364; він же, 1962, Фл. УРСР, **11**: 337; Поляк. 1961, Фл. СССР, **26**: 538, pro syn. *A. salsooides* Willd.; Tutin, 1976, Fl. Europ., **4**: 185, pro syn. *A. salsooides* Willd.; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 165, pro syn. *A. salsooides* Willd.

За протологом: «RSS Ukr., dit. Voroshilovgradensis, distr. Lissiczanskiensis, in cretaceis ad p. Mirnaja Dolina, 20 VIII 1939, Th. Grynj. — Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н, на меловых отложениях у с. Мирная Долина, 20 VIII 1939, Гринь».

Тип: «RSS Ukr., Voroshilovogradensis, distr. Lissiczanskiensis, in cretaceis ad p. Mirnaja Dolina, 20 VIII 1939, Th. Grynj. — УССР, Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н, на меловых отложениях у с. Мирная Долина, 20 VIII 1939, Гринь» (*LE* s.n. — isotypus).

Примітка. У цитованій праці М. Клокова (1954 р.) зазначено, що «Тип хранится в Гербарии Института ботаники АН УССР (Киев), котип — в Ботаническом институте им. В.Л. Ко-

марова АН СССР (Ленінград). У фондах *KW* голотип цього виду не виявлений, тому ми наводимо лише ізотип з *LE*. У *KW* натомість є зразок, який, проте, не має визначення М.В. Клокова: «На крейдяних схилах понад р. Дінцем вище с. Шипалівки, Лисичанського р-ну, Ворошиловградської обл., 16 VIII 1939, leg. Ф. Гринь» (*KW* № 005020). Крім цього, у колекції типів судинних рослин *KW* зберігається так званий «топотип» виду: «RSS Ukr., dit. Voroshilovgradensis, distr. Lissiczanskiensis, prope р. Mirnaja Dolina, dictum in declivis cretaceis. Locus classica [sic!]! Topotypus! M.K. 8 Aug. 1973, A. Deripova, Det. M. Klokov» (*KW* №№ 005019, 005021).

13. *Artemisia taurica* Willd. 1803, Sp. Pl., **3**, 3: 1837; Поляк. 1961, Фл. СССР, **26**: 578; Клоков, 1962, Фл. УРСР, **11**: 340; Леонова, в Е. Вульф, 1969, Фл. Крыма, **3**, 3: 22; Tutin, K. Persson, 1976, Fl. Europ., **4**: 182; Филат. 1984, Новости сист. высш. раст., **21**: 175; Цвєлев, 1994. Фл. европ. ч. СССР, **7**: 171; Мінатулаєв, 1965, Укр. ботан. журн., **22**, 3: 30, р. р. pro *A. graveolens* Minat.

За протологом: «Habitat in Tauria».

Тип: «Habitat in Tauria» (*B* — holotypus; *LE* — photo № 15398 et isotypus).

14. *Artemisia trautvetteriana* Besser, 1845, Mem. Pres. Acad. Sci. Petersb. Div. Sav., **4**: 464, excl. var. *erecta*; Поляк. 1961, Фл. СССР, **26**: 537; Tutin, 1976, Fl. Europ., **4**: 185; Леонова, 1987, Новости сист. высш. раст. **24**: 191; Клоков, 1961, Фл. УРСР, **11**: 336, pro syn. *A. arenaria* DC.

За протологом: «In sabulosis maritimis Odessam inter et Ostia typae».

Тип: «In sabulosis maritimis Odessam inter et Ostia typae. Agro. Sep. N 105. Herb. rectu. Centr. [c. et.....]» (*LE* s.n. — lectotypus cum sp. authentica: T. Leonova, 1986, in herb.).

Примітка. У гербарії W. Besser (*KW*) папка з матеріалами до цього виду відсутня.

ASTER L.

15. *Aster amelloides* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: **33**, non Hoff. 1801; Тамамш. 1959, Фл. СССР, **25**: 87. Bernh. in Rchb. 1831, Fl. Germ. Excurs., **2**: 246, pro syn. *A. bessarabicus* Bernh. ex Rchb.; Соó, 1966, Acta Bot. Acad. Sci. Hung., **12**, 3—4: 366, pro syn. *Aster amellus* L. subsp. *bessarabicus* (Bernh. ex Rchb.) Соó; Цвєлев, 1994, Фл. Европ. ч. СССР, **7**: 185, pro syn. *A. amellus* L. subsp. *bessarabicus* (Bernh. ex Rchb.) Соó; Merxm. a Schreib. 1976, Fl. Europ., **4**: 115, pro syn. *A. amellus* L.

За протологом: «In Volhyniae et Podolia elatis».

Тип: «Volh. et Pod.» (*KW* № 083004 — lectotypus: N. Shiyan et al., hoc loco (N. Shiyan, O. Kornienko, 02.07.2007, in herb.); *LE* s.n. — paratypus?).

Примітка. В *LE* зберігається зразок без номера: «Herb. Fischeri. *Aster elegans* W. *Aster amelloides* mihi. In sumetis Volhyn. Herb. W. Besser», обраний свого часу Л. Крицькою (2001, in herb.) за лектотипом. Оскільки в цьому випадку лектотипіфікація проведена формально і її результати не опубліковані, то лектотипом даного таксона ми вважаємо виявлений у колекції W. Besser зразок (*KW* № 083004), етикетка якого найповніше відповідає протологу. Стосовно зразка з *LE*, то ми схильні розглядати його як паратип.

16. *Aster dracunculoides* Lam. 1780, Encycl. Méth. Bot., **1**: 303; Merxm. 1974, Bot. J. Linn. Soc. (London), **68**: 279, pro syn. *A. sedifolius* L. subsp. *dracunculoides* (Lam.) Merxm.; Merxm. et Schreib. 1976, Fl. Europ., **4**: 116, pro syn. *A. sedifolius* L.

subsp. *dracunculoides* (Lam.) Merxm.; Ness, 1832, Gen. Sp. Aster.: 164, pro syn. *Galatella dracunculoides* (Lam.) Nees; Цвєлев, 1959, Фл. ССР, 25: 162, pro syn. *G. dracunculoides* (Lam.) Nees; Доброч. 1962, Фл. УРСР, 11: 54, pro syn. *G. dracunculoides* (Lam.) Nees; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. ССР, 7: 191, pro syn. *G. dracunculoides* (Lam.) Nees.

За протологом: місце опису не вказане, ймовірно, описане за садовим екземпляром, який походить із Кавказу або України.

Тип: можливо, зберігається в гербарії *P.*

17. *Aster jailicola* Juz. in herb. — Цвєлев, 1994, Фл. Европ. ч. ССР, 7: 185, pro syn. *A. amellus* L. subsp. *ibericus* (M.Bieb.) Avetis.

Примітка. У гербарії *LE* зберігаються три гербарні зразки наміченого С. Юзепчуком для опису нового виду з Криму. Два з них — це дублети: «*A. jailicola* Juz. Typus! Гора Чатыр-Даг, на самой вершине Эклизы-Бурун — Montes Tschatyr-dagh, in summe apice m. Eklizi-Burun. 06 VII 1948 [S. Juzepczuk]». Третій зразок зібраний раніше: «Бабуган-Яила, недалеко от перевала Гаврель-Богаз. — In Jajla Babugan [...] procul a [...] Gavrel-Bogaz, N 416, 08 VIII 1946. S. Juzepczuk».

***BARKHAUSIA* Moench.**

18. *Barkhausia pseudoalpina* Klokov, 1965, Фл. УРСР, 12: 569, 340; P.D. Sell, 1976, Fl. Europ., 4: 354, pro syn. *Crepis alpina* L.; Цвєлев, 1989, Фл. европ. ч. ССР, 8: 136, pro syn. *C. alpina* L.

За протологом: «Tauria: Magaracz, 7 VII 1889, I. Paczoski. Kioviae conservatur».

Тип: «Крым, Гурзуф, 26 V 1931, P. Oksijuk» (*KW* № 071077 — lectotypus: N. Shiyan et al., hoc loco (N. Shiyan, 23.11.2007, in herb.)); «Flora Taurica. Можжевельниковый лес между Мартыном и Гурзуфом, 11 V 1917, S. Stankow» (*KW* № 071079 — paratype: N. Shiyan et al., hoc loco (N. Shiyan, 23.11.2007, in herb.)); «Plantaе Tauricae. Окрестности Никитского сада. Виноградник Анастасьевой, 22(09) V 1922, S. Stankow» (*KW* № 071078 — paratype: N. Shiyan et al., hoc. loco (N. Shiyan, 23.11.2007, in herb.)).

Примітка. У протозі зазначено, що тип виду зберігається в *KW* («Kioviae conservatur»), але у фондах *KW* такого зразка не знайдено, як й інших досліджуваних зразків (паратипів), зібраних Й. Пачоським. Лектотип обрано з наявних трьох із п'яти наведених у протозі паратипів, зразки якого представлені цілими рослинами з кошками та сім'янками. Всі наявні паратипи, зібрані С. Станковим, мають детермінанти М. Клокова: «*B. pseudoalpina* Klokov, 24 XI 1961, M. Klokov».

***CARDUUS* L.**

19. *Carduus albidus* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 269; Тамамшян, 1963, Фл. ССР, 28: 34, pro syn. *C. arabicus* Jacq.; Черепанов, 1995, Сосуд. раст. Рос. со-пред. госуд.: 89, pro syn. *C. rupestris* L. subsp. *albidus* (M. Bieb.) Kazmi.

За протологом: «...in incultis Tauriae et ad Caucasum, etiam in Iberia».

Тип: лектотип, імовірно, зберігається в гербарії *LE*.

20. *Carduus attenuatus* Klokov, 1962, Фл. УРСР, 11: 570, 517; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. ССР, 7: 232, pro syn. *C. nutans* L. subsp. *leiophyllum* (Petrovič) Stojan. et Stef.; Franco, Afonso, 1976, Fl. Europ., 4: 223, pro syn. *C. thoermeri* Weinm.

За протологом: «RSS Ucr., ditio Sumensis, distr. Lebediniensis, reservatum steppeaceum Michajlivs'ka tzylina dictum, 09 VII 1958, Z. Saryczeva, M. Trochimenko, G. Hirczenko».

Тип: «Сумська обл., Лебединський р-н, Михайлівська цілина, плато, 09 VII 1958, З.А. Саричева, М.Д. Трохименко, Г.Ф. Гірченко» (*KW* № 005023 — holotypus; *KW* № 005022 — isotypus).

21. *Carduus bicolorifolius* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11**: 566, 499; Franco, Afonso, 1976, Fl. Europ., **4**: 225, pro syn. *C. personata* (L.) Jacq. subsp. *albidus* (Adamov.) Kazmi; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 233, pro syn. *C. personata* (L.) Jacq. subsp. *albidus* (Adamov.) Kazmi; Тамамш. 1963, Фл. СССР, **28**: 27, pro syn. *C. personata* (L.) Jacq.

За протологом: «RSS Ucr., ditio Stanislavensis, pag. Knjazh-dvir, in reservato Taxi ad ripam dextram fl. Prut, 07 VII 1957, M. Kotov et T. Omeljczuk».

Тип: «Станиславская обл., Коломийский р-н, с. Княждвор, Шепарецкое лесничество, тисовый заповедник, на правом берегу р. Прут, 07 VII 1957, М. Котов, Т. Омельчук» (*KW* № 005028 — holotypus; *KW* №№ 005024—005027 — isotypi).

22. *Carduus fortior* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11**: 567, 504; Тамамш. 1963, Фл. СССР, **28**: 24, pro syn. *C. acanthoides* L.; Franco, Afonso, 1976, Fl. Europ., **4**: 224, pro syn. *C. acanthoides* L.; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 232, pro syn. *C. acanthoides* L.

За протологом: «RSS Ucr., dit. Ternopoliensis, opp. Kremenetz, Montes Kremenetenses, in declivitate, 11 VIII 1960, M. Klokov et B. Zaverucha».

Тип: «Тернопільська обл., Кременець, Кременецькі гори, Дівочі скелі. Лісовий схил біля підніжжя, 11 VIII 1960. М. Клоков, Б. Заверуха» (*KW* № 005031 — holotypus; *KW* № 005029, 005030 — isotypi).

23. *Carduus kondratjukii* Gorlaczova, 1985, Ukr. botan. журн., **42**, 5: 52.

За протологом: «RSS Ucr., ditio Donetskensis, districtus Krasnolimanensis prope pagum Schandrigolova, decline pharangium, 21 VI 1982, Z. Gorlachova. — УРСР, Донецька обл., Краснолиманський р-н, поблизу с. Шандриголове, схил яру, 21 VI 1982, З.С. Горлачева».

Тип: «Донецкая обл., Краснолиманский р-н, окрестности с. Шандриголова, склоны оврага, 21 VI 1982, З.С. Горлачева» (*DNZ* s.n. — holotypus; *KW* №№ 005032, 005033 — isotypi).

24. *Carduus hamulosus* β. [var.] *pseudocollinus* Schmalh. 1886, Фл. юго-зап. Рос.: 317; Клоков, 1953, Визн. росл. УРСР: 566, pro syn. *C. pseudocollinus* (Schmalh.) Klokov; Клоков, 1962, Фл. УРСР, **11**: 510, pro syn. *C. pseudocollinus* (Schmalh.) Klokov; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 233, pro syn. *C. hamulosus* Ehrh.

За протологом: «...из южн. Под.! также Бессараб. Хот. у. Каракутаты! Херс. Одесса!».

Тип: «Бессараб[ия], Хотинский уезд, Каракутаты, 25 Grotes 1857, К. Елский» (*KW* № 070801 — lectotypus: N. Shiyan et al., hoc loco; *KW*s.n. — paratypi: N. Shiyan et al., hoc loco).

Примітка. Лектотип виду міститься в колекції І.Ф. Шмальгаузена. Він являє собою верхню частину стебла з квіткою. На цьому ж гербарному аркуші є фрагмент стебла і листок, етикетовані як «*C. hamulosus* Mariupоль, собр. [...]. Паратипи цього виду (*KW*s.n.: «*C. collinus* W. et K. Pod[olia] orientalis. Herb. W. Besser», «*C. collinus* W. et K. Bessarabia, gubern. Cherson», «*C. collinus* + Odessa») зберігаються в гербарії W. Besser у папці під назвою «*C. collinus*», на сорочці якої, крім зазначененої назви, олівцем дописано: «*C. hamulosus* β. *pseudocollinus*».

25. *Carduus tauricus* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11**: 569, 551; Franco, Afonso, 1976, Fl. Europ., **4**: 226, pro syn. *C. hamulosus* Ehrh.; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 233, pro syn. *C. hamulosus* Ehrh.

За протологом: «RSS Ucr., Tauria praemontana, prope pag. Skvortzovo, in calcareis, 6 VII 1956, M. Kotov».

Тип: «Кримская обл., Сакский р-н, с. Скворцово, известняки, 06 VII 1956, М. Котов» (*KW* № 005035 — lectotypus: N. Shiyan et al., hoc loco; *KW* №№ 005034, 005036, 005037 — isolectotypi: N. Shiyan et al., hoc loco).

Примітка. На етикетці зразка *KW* № 005034 М. Котовим додано: «...известняки I-ой гряды Крымских гор...».

26. *Carduus tortuosus* Gorlaczova et Kondr. 1985, Укр. ботан. журн., **42**, 5: 54; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 233, pro syn. *C. hamulosus* Ehrh.

За протологом: «RSS Ucr., regio Dnepropetrovskiensis, in vicinia oppidi Marganez, vallicula «Kruitenkaja», declivitates stepposae, 22 VII 1982, Z. Gorlaczova. — УРСР, Дніпропетровська обл., м. Марганець, балка Крутенька, степові схили, 22 VII 1982, З.С. Горлачова».

Тип: «УРСР, Дніпропетровська обл., м. Марганець, балка Крутенька, степові схили, 22 VII 1982, З.С. Горлачова» (*DZN* s.n. — holotypus, *KW* № 005038 — isotypus).

27. *Carduus tyraicus* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11**: 568, 507; Тамамш. 1963, Фл. СССР, **28**: 22, pro syn. *C. hamulosus* Ehrh.; Franco, Afonso, 1976, Fl. Europ., **4**: 226, pro syn. *C. hamulosus* Ehrh.; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 233, pro syn. *C. hamulosus* Ehrh.

За протологом: «RSS Ucr., Podolia, Rashkov ad Borysthenem, 04—06 VII 1889, I. Schmalhausen».

Тип: «Под[олия]. г. Рацков при Днестре. 4—6 іюня 1889 г. I. Schmalhausen» (*KW* № 005039 — holotypus).

Примітка. У протолозі допущені помилки в даті (місяць збору типового зразка) та назві басейну річки.

28. *Carduus uncinatus* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., **3**: 553; Тамамш. 1963, Фл. СССР, **28**: 26; Franco, Afonso, 1976, Fl. Europ., **4**: 226; Цвєлев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 233.

За протологом: «...in Tauria meridionali, in ruderatis circa Kisljar, prope Astrachan, ad Hypanim circa Nikolaew».

Тип: «Ex [...] oppidi Nikolaef a. 1820» (*LE* s.n. — lectotypus: N. Shiyan et al., hoc loco).

CARLINA L.

29. *Carlina cirsoides* Klokov, 1954, Ботан. мат-лы (Ленинград), **16**: 355; Линч. 1962, Фл. СССР, **27**: 87; Клоков, 1962, Фл. УРСР, **11**: 422, рис. 79; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 212; Webb, 1976, Fl. Europ., **4**: 210, pro syn. *C. acaulis* L. subsp. *simplex* Nym.

За протологом: «RSS Ucr., dit. Kioviensis, in silva prope opp. Beliczi, VIII 1901, A. Rakoczi (H.F.R., N 1523, sub *C. acaulis* var. *simplex*). — УССР, Киевская обл., в лесу около г. Беличи, VIII 1901, А. Ракочи».

Тип: «Herbarium Flora Rossicae № 1523: Prov. et distr. Kiew, in sylva pr. Beliczi, Aug. 1901, A. Rakoczi. — Киевская губ[ерния] и у[езд]. В лесу около с. Беличи. Авг. 1901. А. Ракочи» (*LE* s.n. — holotypus, isotypus; *KW* №№ 005040, 005041 — isotypi; *KW* №№ 070241 — 070243 — paratypi).

Примітка. У протолозі М. Клоков зазначив, що тип (голотип) зберігається в Гербарії *LE*, котипи (изотипи) — в різних гербаріях, оскільки тип обрано з дублетів, які видавалися у складі ексикати «Гербарий Русской флоры» за назвою *C. acaulis* var. *simplex* W.K. У гербарії *KW*, крім ізотипу, є екземпляр (*KW* № 005041) з оригінальною етикеткою А. Ракочі, на якій міститься детальніша інформація, ніж у протолозі: «Киевск[ая] губ[ерния] и у[езд], ок[рестности] с. Беличи, в смешаном (сосна, дуб) лесу, порубка, 06 VIII 1901, А. Ракочи». На цьому ж зразку є нотатка М. Клокова: «*Carlina cirsoides* Klok. 31 VIII 1960, Det. M. Klokov». Цей зразок, імовірно, не був врахований під час опису виду, тому його не можна розглядати як isotypus.

30. *Carlina onopordifolia* Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl. 1924, Rośl. Polskie: 641; Линч. 1962, Фл. СССР, **27**: 84; Клоков, 1962, Фл. УРСР, **11**: 421; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 212; Webb, 1976, Fl. Europ., **4**: 210, pro syn. *C. acanthifolia* auct. non. All.

За протологом: «...k. Rohatyna, k. Krzemienca, k. Chelmu, k. Pinczowa...».

Тип: «*C. acanthofolia* All. β. *cynara* DC, [En-pl] Volh[inia], *C. onopordifolia* mihi. Herb. W. Besser» (*KW* № 071052 — lectotypus: N. Shiyan et al., *hoc loco*).

Примітка. За лектотип обрано єдиний гербарний зразок з колекції W. Besser, на якому зазначено: «*C. onopordifolia* mihi». Усі інші зразки папки, де зберігається лектотип, визначені як *C. acanthifolia* All.

31. *Carlina taurica* Klokov, 1962, Фл. УРСР, **11**: 558, 429, рис. 80; Линч. 1962, Фл. СССР, **27**: 79, pro syn. *C. vulgaris* L.; Клоков, 1962, Фл. УРСР, **11**: 426, pro syn. *C. vulgaris* L.; Цвелев, 1994, Фл. европ. ч. СССР, **7**: 212, pro syn. *C. vulgaris* L.

За протологом: «RSS Ucr., Tauria montana, in reservatio silvatico, prope speculam Alabacz dictam, declivium ad margines silvae, 01 VIII 1955, M. Klokov».

Тип: «Крым, Ялтинский р-н, Госзаповедник, горные склоны у кордона Алабач, луговая степь, 01 VIII 1955, М. Клоков» (*KW* № 070570 — lectotypus: N. Shiyan et al., *hoc loco*; *KW* № 070567 — 070569 — isolectotypi: N. Shiyan et al., *hoc loco*).

Рекомендує до друку
Я.П. Дідух

Надійшла 10.06.2010

Н.Н. Шиян, С.Л. Мосякин, О.М. Корниенко, Н.М. Федорончук

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев

**ТИПИФИКАЦІЯ ТАКСОНОВ СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE ФЛОРЫ УКРАИНЫ:
РОДЫ ARTEMISIA L., ASTER L., BARKHAUSIA Moench., CARDUUS L., CARLINA L.**

Приведен список видов семейства *Asteraceae* (роды *Artemisia*, *Aster*, *Barkhausia*, *Carduus*, *Carlina*), описанных с территории Украины. Для каждого вида указаны базионим, синонимика, протолог, номенклатурный тип и место его хранения.

Ключевые слова: тип вида, голотип, лектотип, изотип, Asteraceae, Artemisia, Aster, Barkhausia, Carduus, Carlina, гербарий KW.

N.M. Shiyan, S.L. Mosyakin, O.M. Kopnienko, M.M. Fedoronchuk

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv

**TYPIFICATION OF TAXA OF FAMILY ASTERACEAE IN THE FLORA
OF UKRAINE: GENERA ARTEMISIA L., ASTER L., BARKHAUSIA Moench.,
CARDUUS L., CARLINA L.**

The list of species of vascular plants of the family *Asteraceae* (genera *Artemisia*, *Aster*, *Barkhausia*, *Carduus*, *Carlina*) described from Ukraine is presented. For each species, the following data are provided: basionym; synonymy, type according to the protologue, nomenclatural type and its location (herbarium).

Key words: Asteraceae, Artemisia, Aster, Barkhausia, Carduus, Carlina, *herbarium KW.*