



<https://doi.org/10.15407/ukrbotj81.06.433>

RESEARCH ARTICLE

Нові для України представники родів *Bolbitius* і *Conocybe* (*Bolbitiaceae*, *Basidiomycota*)

Микола П. ПРИДЮК 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
вул. Терещенківська 2, Київ 01601, Україна

Адреса для листування: prydiuk@gmail.com

Реферат. Стаття містить дані про знахідки деяких нових та рідкісних для України таксонів із родів *Bolbitius* і *Conocybe*. Два види (*Conocybe ambigua*, *C. rickenii*) та один різновид (*Bolbitius titubans* var. *olivaceus*) знайдені в Україні вперше, в той час як для чотирьох видів (*Conocybe macrocephala*, *C. macrospora*, *C. subpallida* та *C. subpubescens*) і одного різновиду (*Conocybe subxerophytica* var. *brunnea*) виявлені нові місцезнаходження. Для всіх вищезгаданих таксонів наведені дані щодо розповсюдження в Україні та світі. Для нових в нашій країні видів та різновидів також додані описи та оригінальні рисунки макро- та мікроознак.

Ключові слова: нові знахідки, рідкісні види, різновид, розповсюдження, *Agaricales*, *Bolbitius*, *Conocybe*

Вступ

Представники родини *Bolbitiaceae* (*Agaricales*, *Agaricomycetes*, *Basidiomycota*) довгий час привертали дуже мало уваги з боку українських мікологів. Так, у відповідному томі "Визначник грибів України" (Zerova et al., 1979) було наведено лише 10 видів із вказаної родини. Стан вивченості цієї групи значно покращився з виходом тому "Флори грибів України", присвяченого саме цій родині (а також родині *Coprinaceae*), де вже були наведені дані про 50 видів цієї родини (Prydiuk, 2015). Проте видовий склад *Bolbitiaceae* в нашій країні все ще не можна вважати

дослідженним повністю. Наприклад, вже після виходу монографії (Prydiuk, 2019) було знайдено кілька нових для України видів та різновидів з цієї родини, і нові знахідки продовжують траплятися. Зокрема протягом останніх кількох років вдалося виявити низку нових для України таксонів родини, а також нові локалітети деяких вже відомих у нас видів та різновидів. Саме про них і йдеється у цій статті.

Матеріали та методи

Форму і розміри плодових тіл описували за свіжозібраними екземплярами. Деталі мікроско-

ARTICLE HISTORY. Submitted 10 July 2024. Revised 27 November 2024. Published 28 December 2024

CITATION. Prydiuk M.P. 2024. New for Ukraine representatives of the genera *Bolbitius* and *Conocybe* (*Bolbitiaceae*, *Basidiomycota*). *Ukrainian Botanical Journal*, 81(6): 433–442. [In Ukrainian]. <https://doi.org/10.15407/ukrbotj81.06.433>

© M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2024

© Publisher PH "Akademperiodyka" of the NAS of Ukraine, 2024

This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ISSN 2415-8860. Український ботанічний журнал. 2024. 81(6)

пічної будови грибів досліджували на сухих карпофорах. Розміри спор, наведені в статті, ґрунтуються на вимірах 20 випадково відібраних екземплярів (у т. ч. найменшого та найбільшого) з одного й того ж плодового тіла. Для інших мікроструктур міряли по 10 об'єктів.

У статті використані такі умовні позначення: av. L — середня довжина спори; av. В — середня ширина спори; L — число довгих пластинок гіmenoфору (які досягають ніжки); l — число коротких пластинок (які не торкаються ніжки) між двома довгими; Q — відношення довжини спори до її ширини (квотіент); av. Q — середнє значення квотіента. Для всіх значень (довжина, ширина та квотіент) розраховували також величину стандартного відхилення (цифра після знаку \pm). Для розрахунків використовували програму Microsoft Excel 2003. Всі розглянуті зразки, окрім спеціально відзначених, зібрани автором і зберігаються в Національному гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW-M).

Результати та обговорення

Загалом було знайдено два види (*Conocybe ambigua* Watling та *C. rickenii* (Jul. Schäff.) Kühner) і один різновид (*Bolbitius titubans* var. *olivaceus* (Quél.) Arnolds), що виявилися новими для України. Для чотирьох видів (*Conocybe macrocephala* Kühner & Watling, *C. macrospora* (G.F. Atk.) Hauskn., *C. subpallida* Enderle та *C. subpubescens* P.D. Orton) і одного різновиду (*Conocybe subxerophytica* var. *brunnea* Hauskn.) були зареєстровані нові місцезнаходження. Більшість вищепозначених таксонів (окрім *Conocybe ambigua*) вже вказувалася у відповідному томі "Флори грибів України" (Prydiuk, 2015) як потенційно вірогідні на території нашої країни, і для них були наведені повні діагнози, складені за літературними даними. Для таких таксонів нижче наводяться оновлені описи з урахуванням результатів вивчення новознайдених українських зразків, а також додаються оригінальні рисунки та фото. Для *Conocybe ambigua* надані оригінальні опис, світлини плодових тіл і рисунки макро- та мікроознак. Для вже відомих з України видів та різновидів додаємо лише оригінальні світлини їхніх карпофорів, а також актуальні дані про розповсюдження їх в Україні та світі. Всі нижчеописані таксони наведені в алфавітному порядку.

Bolbitius titubans (Bull.) Fr. var. *olivaceus* (Quél.) Arnolds, Persoonia 18(2): 204. 2003. — Рис. 1A, 2.

Bolbitius vitellinus var. *olivaceus* Quél., Bull. Soc. bot. Fr. 23: 329. 1877 [1876]. — *Pluteolus vitellinus* var. *olivaceus* (Quél.) Quél., C. r. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 18(2): 510. 1890. [1889]. — *Bolbitius variicolor* G.F. Atk., Studies Amer. Fungi: 164. 1900. — *Mycena variicolor* (G.F. Atk.) Murrill, N. Amer. Fl. 10: 191. 1917. — *Bolbitius vitellinus* var. *variicolor* (G.F. Atk.) Krieglst., Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 7: 62. 1991.

Шапинка 1,5–5,0 см завш., спочатку округла, яйцеподібна, конічнодзвониковидна, пізніше опукла, опуклорозпростерта до плоскорозпростертої, з невеличкою випуклістю в центрі, радіальнорубчаста на 1–2 третини радіусу шапинки, в центрі грубозморшкувата до сітчасто-жилкуватої (жилки дещо темніші, аніж основний фон), слизиста, спочатку вохристо-жовта, оливково-жовта до оливково-коричневої, пізніше, починаючи з країв, стає блідо-коричнюватою, зберігаючи жовтувате або зеленкувате забарвлення лише в центрі. Пластинки вільні, густі (L = 28–50, l = 1–3), випуклі, до 0,3 см завш., спочатку білуваті до солом'яно-жовтих, скоро стають блідо-сірувато-коричневими, пізніше жовто-коричневими до коричнювато-оранжевих, з блідим дрібноторочкуватим краєм, розпливаються під час дозрівання. Ніжка 4,0–10,0 × 0,3–1,0 см, дещо звужується догори, з булавоподібною основою, трубчаста, повністю борошнисто-зерниста, біла, блідо-жовта, жовта до лимонно-жовтої. М'якуш в шапинці до 0,2 см завтов., оливково-жовтий, в ніжці білий до світло-жовтого. Без особливого запаху та смаку. Споровий порошок світло-іржаво-коричневий.

Спори (10,0–)10,5–14,0 × (6,0–)6,5–8,5(–9,0) мкм, Q = 1,43–1,86; av. L = 12,0 ± 0,96 мкм, av. В = 7,1 ± 0,8 мкм, av. Q = 1,54 ± 0,14; дещо сплюснуті, анфас видовженояйцеподібні та еліпсоподібні, в профіль еліпсоподібні до дещо мигдалеподібних, з центральною ростовою порою до 2 мкм завш., товстостінні, медово-жовті у воді, жовто-коричневі до оранжево-коричневих в КОН, прозорі. Базидії 17–25 × 11–13 мкм, булавоподібні, 4-спорові, оточені 4–6 псевдопарафізами кожна. Хейлоцистиди 25–65 × 12–25 мкм, булавоподібні, пляшкоподібні та мішкоподібні, з верхівкою 6–12 мкм завш., численні. Плевроцистиди та пілоцистиди відсутні. Каулоцистиди



Рис. 1. Плодові тіла. А: *Bolbitius titubans* var. *olivaceus* (фото О.М. Балагури); В: *Conocybe macrocephala*; С: *Conocybe subpubescens*; Д: *Conocybe ambigua*; Е: *Conocybe macrospora*; Ф: *Conocybe subpallida*; Г: *Conocybe subxerophytica* var. *brunnea*. Масштаб лінійки: 1 см

Fig. 1. Fruit bodies of A: *Bolbitius titubans* var. *olivaceus* (photo by O.M. Balahura); B: *Conocybe macrocephala*; C: *Conocybe subpubescens*; D: *Conocybe ambigua*; E: *Conocybe macrospora*; F: *Conocybe subpallida*; G: *Conocybe subxerophytica* var. *brunnea*. Bar: 1 cm




Рис. 2. *Bolbitius titubans* var. *olivaceus*. А: плодові тіла; В: базидії; С: хейлоцистиди; Д: каулоцистиди; Е: спори. Масштаб лінійки: 1 см для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig. 2. *Bolbitius titubans* var. *olivaceus*. А: fruit bodies; B: basidia; C: cheilocystidia; D: caulocystidia; E: spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 µm for microstructures

24–55 × 8,5–19,0 мкм, булавоподібні, пляшкоподібні та мішкоподібні, у верхній частині здебільшого коралоподібно розгалужені або з пальцеподібними виростами, численні. Кутікула шапинки гіменоподібна, складається з булавоподібних клітин 8–26 мкм завш., вкритих товстим шаром слизу. Пряжки відсутні.

Поодиноко та невеликими тісними групами на ґрунті, компості, екскрементах травоїдних тварин, гнилих рослинних залишках, переважно в трав'яних (луках, пасовиськах, пустырях) угрупованнях, рідше в лісових та чагарниковых, також у парках і садах, з червня до жовтня. Нейстівний.

Досліджені зразки. Миколаївська обл., м. Миколаїв, парк Перемоги, деревні насадження, на ґрунті, 46°59'06.1"N, 31°59'44.6"E, 25.10.2020 (KW-M71595), зібр. О.М. Балагура.

Загальне поширення. Європа: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Сербія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. Азія: Китайський Тайбей, Японія. Північна Америка: Канада, Мексика, США. Австралазія: Австралія (<https://www.gbif.org/en/species/3323451>).

Bolbitius titubans var. *olivaceus* досить легко відрізняється від типової варіації більшим та масивнішим плодовим тілом, виразною сітчасто-жилкуватою поверхнею шапинки, а також дещо темнішому (від оливкувато-жовтого до

оливкувато-коричневого) забарвленням останньої. Мікроскопічні ознаки більш-менш ідентичні в обох варіаціях *B. titubans* (Arnolds, 2005a), що виявилося справедливим і для українських зразків (Prydiuk, 2015).

Слід вказати, що таксономічний ранг *Bolbitius titubans* var. *olivaceus* залишається поки що дискусійним, і деякі автори (Hausknecht, Vesterholt, 2012a) розглядають його як окремий вид *Bolbitius variicolor* G.F. Atk. У "Флорі грибів України" (Prydiuk, 2015) він теж наводився під цією назвою. Наскільки такий ранг виправданий, поки неможливо достовірно встановити. Отримані останнім часом результати молекулярно-генетичних досліджень *Bolbitius titubans* s. l. (Malysheva et al., 2015) показали, що в його складі можна виділити щонайменше чотири виразно відокремлені клади, але їхній таксономічний статус (чи представляють вони внутрішньовидові таксони, чи окремі види) залишається нез'ясованим через недостатню кількість досліджених зразків.

Conocybe ambigua Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 38(2): 331. 1980. — Рис. 1D, 3.

Conocybe siliginea var. *ambigua* Kühner, Encyclop. Mycol. 7: 106. 1935. — *Galera ambigua* Kühner ex J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 9 (no. 6): 38. 1938. — *Conocybe ambigua* Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 346. 1953. — *Conocybe ambigua* Kühner ex Singer, Mycologia 51(3): 395. 1959.

Шапинка розміром 0,5–2,0 см, спочатку округлонічна згодом від випуклої до випуклорозпростерткої, без горбика, гладенька, гігрофана, сира жовтувато-коричнева до оранжево-коричневої, згодом жовто-коричнева, коричнево-оранжева, більче до країв дещо світліша, прозоро-смугаста майже до центру, підсохла лише злегка світліша. Пластиинки вузькоприрослі, помірно рідкі (L = 16–20, l = 1–3), випуклі, спочатку жовтувато-вохристі, згодом іржаво-коричнюваті, з дещо світлішим, дрібноторочкуватим краєм. Ніжка 2,5–5,5 × 0,1–0,15 см, циліндрична, зі злегка булавоподібно потовщеною або майже бульбоподібною основою (до 0,3 см завш.), трубчаста, борошниста до борошнисто-смугастої, вохристо-коричнювата, з блідішою верхівкою, від основи догори з віком темнішає. М'якуш в шапинці завтовшки до 0,1 см, жовтуватий, в ніжкі темніший, коричнювато-жовтий. Без особливого запаху та смаку. Споровий порошок іржаво-коричневий.

Спори $(10,0\text{--}11,0\text{--}13,0\text{--}14,5) \times 6,0\text{--}7,5$ мкм, $Q = 1,57\text{--}2,0$, av. $L = 12,1 \pm 0,88$ мкм, av. $B = 6,7 \pm 0,39$ мкм, av. $Q = 1,8 \pm 0,13$, анфас еліпсоподібні, еліпсоподібно-лимоноподібні або еліпсоподібно-веретеноподібні, у профіль дещо мигдалеподібні, з ростовою порою до 1,5 мкм завш., злегка товстостінні, жовтуваті у воді, блідо-жовто-коричневі у КОН, прозорі. Базидії $17\text{--}24 \times 6,5\text{--}8,0$ мкм, булавоподібні, 2-спорові. Хейлоцистиди $15\text{--}25 \times 6,0\text{--}7,5$ мкм, кеглеподібні, з шийкою до 5,5 мкм завд. та до 2 мкм завтов., з голівкою 3,0–4,5 мкм шириною, численні. Плевроцистиди та пілоцистиди не виявлені. Каулоцистиди трьох типів: а) кеглеподібні, $19\text{--}25 \times 8\text{--}12$ мкм, з шийкою до 5 мкм завд. і голівкою 3,0–3,5 мкм завш., трапляються переважно на верхівці ніжки, донизу поступово зникають; б) округло булавоподібні та мішкоподібні, розміром $10\text{--}22 \times 6,0\text{--}9,5$ мкм, досить численні; в) волосоподібні, до 2 мкм завтов., довжиною до 100 мкм, досить численні. Кутікула шапинки гіменоподібна, складається з округлобулавоподібних та округлогрушоподібних клітин 22–55 мкм завширшки. Є пряжки. Амонійна реакція¹ негативна.

Плодові тіла ростуть поодиноко на ґрунті або старих кострищах, у лісах та на узбіччях доріг, зрідка на луках, з травня до жовтня (Hausknecht, 2009). Неїстівний.

Досліджені зразки. Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Національний природний парк (НПП) "Мале Полісся", південно-західна околиця с. Стригани, берег оз. Блакитне, сосновий ліс, на старому кострищі, $50^{\circ}18'38.4''\text{N}$, $26^{\circ}46'14.5''\text{E}$, 13.09.2018 (KW-M71596).

Загальне поширення. Європа: Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Росія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція. Азія: Росія (Сибір, Далекий Схід). Північна Америка: Канада (Hausknecht, 2009; Malsheva, 2018; <https://www.gbif.org/species/2529746>).

Слід зазначити, що вищеописаний зразок має дещо менші спори, аніж більшість авторів

¹ Амонійна реакція — утворення голкоподібних кристаликів (кристалики іншої форми, наприклад призматичні, зірчасті або паличикоподібні, не є ознакою цієї реакції) у мікроскопічних препаратах гіменію гриба, змонтованих у 25%-му водному розчині аміаку (Hausknecht, 2009). Вона використовується в якості додаткової ознаки для визначення представників роду *Conocybe*.




Рис. 3. *Conocybe ambigua*. A: плодові тіла; B: базидії; C: хейлоцистиди; D: каулоцистиди; E: спори. Масштаб лінійки: 1 см для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig. 3. *Conocybe ambigua*. A: fruit bodies; B: basidia; C: cheilocystidia; D: caulocystidia; E: spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 µm for microstructures

наводять для *Conocybe ambigua*: $(11\text{--}12\text{--}14\text{--}16)$ $\times 6\text{--}8\text{--}(9)$ мкм (Watling, 1982), $(10,0\text{--}10,5\text{--}15,5\text{--}16,5) \times 5,5\text{--}7,5\text{--}(8,5)$ мкм (Arnolds, 2005b) або $10,5\text{--}16,0 \times 5,0\text{--}8,5$ мкм (Hausknecht, 2009; Hausknecht, Vesterholt, 2012b). Це зближує вказаний зразок з такими видами, як *Conocybe bispora* (Singer) Hauskn. або *C. tetrasporeoides* Hauskn., що характеризуються меншими, ніж у *C. ambigua* спорами. Проте перший з них не має жодних кеглеподібних каулоцистид, навіть на верхівці ніжки, а другий відрізняється 4-споровими базидіями (і спори має ще менші, ніж в українського зразка). Необхідно також вказати на специфічну форму спор *C. ambigua*, які часто бувають еліпсоподібно-лимоноподібними та еліпсоподібно-веретеноподібними. Саме такі спори часто спостерігаються в українського зразка, що й дозволяє ідентифікувати його як *C. ambigua*. Ще два види (*Conocybe macrospora* (G.F. Atk.) Hauskn. та *C. merdaria* Arnolds & Hauskn.) з двосporовими базидіями та подібною до *Conocybe ambigua* будовою поверхні ніжки, відрізняються від нього помітно більшими (особливо *C. macrospora*) та виразно еліпсоподібними спорами (Hausknecht, 2009).

***Conocybe macrocephala* Kühner & Watling in Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb., 38: 335. 1980.**

— Рис. 1B.

***Conocybe tenera* f. *macrocephala* Kühner, Genre Galera: 73. 1935. — *Conocybe macrocephala* (Kühner) Kühner & Romagn., Fl. anal. Champ. Sup.: 346. 1953. — *Conocybe abrubtibulbosa* Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb., 38: 345. 1980. — *Conocybe herinkii* Svrček, Czech Mykol., 48: 295. 1996.**

Зростає поодиноко та невеликими групами на ґрунті в листяних лісах, з червня до жовтня. Рідкісний. Нейстівний.

Досліжені зразки. Вінницька обл., Гайсинський р-н, НПП "Кармелюкове Поділля", Червоногребельське природоохоронне науково-дослідне відділення (далі по тексту — ПНДВ), кв. 50, грабово-дубовий ліс, на ґрунті, 48°06'08.0"N, 29°17'18.6"E, 08.11.2023 (KW-M71798), Дохнянське ПНДВ, кв. 79, ясеново-грабовий ліс, на ґрунті, 48°15'49.8"N, 29°07'05.1"E, 09.11.2023 (KW-M71599).

Інші місцезнаходження в Україні. Тернопільська обл., Чортківський р-н, природний заповідник "Медобори", Вікнянське ПНДВ, 24 кв., грабовий ліс, на ґрунті, 26.06.2007, кв. 27, грабово-дубовий ліс, на ґрунті, 25.09.2007, кв. 43, грабовий ліс, на ґрунті, 30.09.2007, Городницьке ПНДВ, кв. 40, грабовий ліс, на ґрунті, 29.09.2007, Краснянське ПНДВ, кв. 39, грабовий ліс, на ґрунті, 28.09.2007 (Придюк, 2015).

Загальне поширення. Європа: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Росія, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. Азія: Росія (Сибір), Узбекистан. Північна Америка: США (Hausknecht, 2009; Malysheva, 2018; <https://www.gbif.org/species/8255416>).

Для *Conocybe macrocephala* характерна комбінація таких ознак, як досить маленькі тонкостінні спори, цистиди з відносно великою (5,0–6,5 мкм) голівкою та позитивна амонійна реакція. Близкий вид *C. tenera* (Schaeff.) Kühner має більші товстостінні спори та цистиди з меншою (3,0–5,5 мкм) голівкою. У деяких випадках (коли амонійна реакція слабко виражена) *C. macrocephala* можна перепутати з *C. juniana* (Velen.) Hauskn. & Svrček, котрий, однак, має дрібніші плодові тіла, більші спори з товстішими стінками темнішого кольору і каулоцистиди з голівкою значно більшого розміру (6–12 мкм) (Hausknecht, 2009).

***Conocybe macrospora* (G.F. Atk.) Hauskn.,**
Österr. Z. Pilzk., 12: 64. 2003. — Рис. 1Е.

Galerula macrospora G.F. Atk., Genus *Galerula* in North America: 371. 1918. — *Galera megalospora* Jul. Schäff., Z. Pilzk. 9: 170. 1930. — Non *Conocybe megalospora* Singer, Lilloa 25: 297. 1953 (= *Conocybe pubescens*). — *Conocybe rubiginosa* Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb., 38: 353. 1980.

Зростає поодиноко та невеликими групами на гної, утвоєному ґрунті, компості, іноді на старих кострищах в листяних, хвойних та мішаних лісах, а також на луках і пасовищах, з липня до жовтня. Рідкісний. Нейстівний.

Досліжені зразки. Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Карпатський НПП, Ворохтянське ПНДВ, близько 2,5 км південніше смт Ворохта, ялиновий ліс з домішкою вільхи сирої, на ґрунті, 48°15'30.0"N, 24°35'01.8"E, 09.09.2015 (KW-M71604).

Інші місцезнаходження в Україні. Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, НПП "Прип'ять-Стохід", околиці с. Сваловичі, грабовий ліс, на гної коня, 19.07.2010 (Prydiuk, 2015); Маневицький р-н, Черемський природний заповідник, кв. 23, сосновий ліс з домішкою дуба, на старому кострищі, 09.09.2004 (Prydiuk, 2007a, 2015). Чернівецька обл., Вижницький р-н, НПП "Вижницький", Солонянське ПНДВ, ур. "Стебник", права тераса р. Стебник, луки, на ґрунті, 06.09.2013, там само, правий берег р. Стебник, узбіччя дороги, на ґрунті, 08.09.2013, ур. "Лекече", близько 2 км східніше с. Лекече, ялицевий ліс, на старому кострищі, 07.09.2013 (Prydiuk, 2015).

Загальне розповсюдження. Європа: Австрія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Літва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція. Азія: Росія (Сибір), Таджикистан, Узбекистан. Африка: Танзанія. Північна Америка: Канада, Пуерто-Ріко, США. Південна Америка: Аргентина. Австралазія: Нова Зеландія (Hausknecht, 2009; Malysheva, 2018; <https://www.gbif.org/species/8255416>).

Conocybe macrospora досить легко відрізни-ти від інших представників роду завдяки такій комбінації ознак, як 2-спорові базидії, дуже великі товстостінні спори понад 17 мкм завд. та наявність на поверхні ніжки суміші кеглеподібних та волосоподібних каулоцистид. Найбільш споріднений вид, *C. pubescens* (Gillet) Kühner, має схожі спори, але відрізняється 4-споровими базидіями. Іноді з *C. macrospora* можна спутати *C. rickenii* (Jul. Schäff.) Kühner, оскільки в останнього іноді трапляються поодинокі кеглеподібні каулоцистиди на верхівці ніжки. Крім того, він теж розвивається на гної, має 2-спорові базидії та спори приблизно такого ж розміру.

Однак його можна відрізняти завдяки світлішим плодовим тілам (які в молодому віці часто мають оливкуватий відтінок) та повній відсутності кеглеподібних каулоцистид в середній та нижній частинах ніжки (Hausknecht, 2009).

***Conocybe rickenii* (Jul. Schäff.) Kühner, Genre Galera: 115. 1935. — Рис. 4.**

Galera rickenii Jul. Schäff., Z. Pilzk., 9: 171. 1930. — *Conocybe siliginea* sensu Singer, Acta Inst. Bot. Komarov Acad. Sci. USSR, 2, 6: 44. 1950. — *Conocybe siliginea* f. *rickenii* (Jul. Schäff.) Arnolds, Persononia, 18: 228. 2003. — *Galera rugmaeoaffinis* sensu Ricken, Blätterpilze: 225. 1915. — *Conocybe coprophila* sensu Lundell in Lundell & Nannf., Fungi exs. Suec., 49–50: 906. 1957.

Шапинка розміром 0,7–5,0 см, спочатку дзвонкоподібна або опуклодзвоноподібна, пізніше округлонічна до конічноопуклої, гладенька, злегка клейка в сиру погоду, спочатку сірувато-вохристя або світло-сірувато-коричнева, з оливковим відтінком, у центрі темніша, пізніше блідо-сірувато-жовта або блідо жовтувато-коричнева, гігрофана, не прозоро-смугаста, після підсихання стає кремовою, сірувато-білою або білувато-вохристою. Пластиинки вузько-прирослі, густі до помірно рідких ($L = 15\text{--}25$, $l = 1\text{--}3(-7)$), опуклі, шириною до 0,4 см, спочатку блідо-вохристі, пізніше оранжево-коричневі до іржаво-коричневих, з білуватим дрібно-торочкуватим краєм. Ніжка 3,0–8,5 × 0,1–0,4 см, циліндрична, з дещо булавоподібно потовщеною основою, трубчаста, борошнисто-смугаста, слабко пухнасто-оксамитова, спочатку блідо-коричнева, пізніше, починаючи знизу, темнішає до світло-коричневої або буруватої біля самої основи. М'якуш в шапинці білуватий, в ніжці блідо-коричнюватий, буруватий біля основи. Без особливого запаху та смаку. Споровий порошок іржаво-коричневий.

Спори $14,0\text{--}17,0(-19,5) \times 8,5\text{--}11,5$ мкм, $Q = 1,63\text{--}1,92$; av. $L = 16,0 \pm 1,37$ мкм, av. $B = 9,3 \pm 0,82$ мкм, av. $Q = 1,72 \pm 0,09$; анфас яйцеподібні, видовженояйцеподібні, еліпсоподібні до видовженоеліпсоподібних, у профіль дещо приплюснуті, еліпсоподібні, нерідко злегка мигдалеподібні, з ростовою порою 1,8–2,5 мкм шириною, товстостінні, медово-коричневі в воді, іржаво-або червонувато-коричневі в КОН, прозорі. Базидії $20,0\text{--}29,0 \times 13,0\text{--}16,0$ мкм, булавоподібні, 2-спорові, іноді з домішкою 1-спорових. Хейлоцистиди $17,0\text{--}25,0 \times 6,5\text{--}9,5$ мкм, кеглеподібні,




Рис. 4. *Conocybe rickenii*. А: плодові тіла; В: базидії; С: хейлоцистиди; Д: каулоцистиди; Е: спори. Масштаб лінійки: 1 см для плодових тіл, 10 мкм для мікроструктур

Fig. 4. *Conocybe rickenii*. A: fruit bodies; B: basidia; C: cheilocystidia; D: caulocystidia; E: spores. Bars: 1 cm for fruit bodies, 10 µm for microstructures

з шийкою довжиною до 5 мкм і товщиною до 2 мкм, з голівкою 4–5 мкм шириною, численні. Плевроцистиди відсутні. Пілоцистиди волосоподібні або майже циліндричні, розміром до $50,0 \times 2,5\text{--}5,5$ мкм. Каулоцистиди двох типів: а) округлі, округлобулавоподібні, циліндричні, булавоподібні та пляшкоподібні, розміром $7\text{--}30 \times 6,0\text{--}8,5$ мкм; б) волосоподібні, розміром до $100,0 \times 2,0\text{--}2,5$ мкм, численні. Кутикула шапинки гіменоподібна, складається з округлобулавоподібних та округлогрушоподібних клітин 14–40 мкм шириною. Є пряжки. Амонійна реакція негативна.

Поодиноко та групами на гної, компості та угноєному ґрунті, на відкритих місцях (луках, пасовиськах, пустирях, узбіччях доріг), рідше в садах і парках, з червня до листопада. Неїстівний.

Досліджені зразки. Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, південно-східна околиця с. Люб'язь, на березі озера, пасовисько, на гною коня, $51^{\circ}49'40.6''\text{N}$, $25^{\circ}28'57.6''\text{E}$, 07.10.2019 (KW-M71597).

Загальне розповсюдження. Європа: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Литва, Ліхтенштейн, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Словаччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція. Азія: Монголія, Росія (Сибір), Туркменія, Узбекистан. Північна Америка: Канада, США. Південна Америка: Аргентина, Бразилія. Австралазія: Австралія,

Нова Зеландія (Hausknecht, 2009; Malyshova, 2018; <https://www.gbif.org/species/2529858>).

Завдяки 2-споровим базидіям, дуже великим спорам та зростанню на гної *Conocybe rickenii* досить легко відрізняти від споріднених видів. Найближчий вид, *C. siliginea* (Fr.) Kühner, відрізняється меншими розмірами плодових тіл та відсутністю оливкових відтінків в забарвленні шапинки. Крім того, його шапинка не буває клейкою, а росте він переважно на ґрунті. Через наявність поодиноких кеглеподібних каулоцистид на верхівці ніжки *C. rickenii* (хоча в нашого зразка ми їх не спостерігали), його часом можна спутати і з *C. macrospora*. Останній теж іноді трапляється на гної, має 2-спорові базидії та спори приблизно такого ж розміру, однак відрізняється наявністю численних кеглеподібних каулоцистид (поряд з волосоподібними) по всій довжині ніжки (Hausknecht, 2009).

***Conocybe subpallida* Enderle,** Z. Mykol., 57: 91. 1991. — Рис. 1F.

Зростає поодиноко та невеликими групами на ґрунті, в листяних, зрідка соснових лісах та трав'яних місцинах (узбіччя доріг, луках), з весни до листопада. Рідкісний. Неістівний.

Досліджені зразки. Хмельницька обл., Шепетівський р-н, НПП "Мале Полісся", східніше с. Голики, берег оз. Святе, сосновий ліс, на ґрунті, 50°12'58.1"N, 26°50'03.3"E, 14.09.2018 (KW-M71600).

Інші місцезнаходження в Україні. Полтавська обл., Полтавський р-н, околиці смт Диканька, липово-дубовий ліс, на ґрунті, 24.10.2003 (Придюк, 2015). Тернопільська обл., Чортківський р-н, природний заповідник "Медобори", Краснянське ПНДВ, кв. 39, ясеново-грабовий ліс, на ґрунті, 28.09.2007, кв. 33, грабовий ліс, на ґрунті, 09.10.2008 (Придюк, 2015). Чернівецька обл., Вижницький р-н, НПП "Вижницький", Солонянське ПНДВ, ур. Стебник, правий берег р. Стебник, ліс із вільхи сірої, на ґрунті, 06.09.2013, Вижницьке ПНДВ, ур. Лужки, лівий берег р. Виженка, ліс із вільхи сірої, на ґрунті, 09.09.2013 (Дудка та ін., 2019). Харківська обл., Чутгуйський р-н, НПП "Гомільшанські Ліси", близько 2 км на південь від с. Гайдари, листяний ліс, на ґрунті, 13.11.2017, 14.11.2017 (Prylutskyi et al., 2022).

Загальне розповсюдження. Європа: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Словаччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. Африка: Зімбабве, Марокко, Танзанія, Уганда. Азія: Грузія, Індія, Іран, Китайський Тайбей, Кіпр, Росія (Сибір, Далекий Схід). Північна Америка: США. Південна Америка: Аргентина, Болівія, Чилі

Франція, Швейцарія (Hausknecht, 2009; Malyshova, 2018; <https://www.gbif.org/species/7244973>).

Conocybe subpallida размірами спор та формою хейлоцистид нагадує *C. tenera*, але відрізняється тонкостінними блідішими спорами, а також світлозабарвленими плодовими тілами. Крім того, на поверхні його ніжки є помітна домішка некеглеподібних каулоцистид, зокрема пляшкоподібних та циліндричних (Arnolds, 2005b; Hausknecht, 2009).

***Conocybe subpubescens* P.D. Orton,** Trans. Brit. Mycol. Soc., 43: 195. 1960. — Рис. 1C.

Galera tenera sensu Ricken, Blätterpilze: 225. 1915. — *Conocybe pubescens* f. *typica* (Gillet.) Kühner sensu Kühner, Genre Galera: 86. 1935. — *Conocybe pubescens* sensu J.E. Lange, Fl. agar. Dan., 4: 34. 1939. — *Conocybe subpubescens* Kühner, Botaniste 34: 275. 1949. — *Conocybe tetraspora* Singer, Beih. Nova Hedwigia, 29: 209. 1969. — *Conocybe cryptocystis* (G.F. Atk.) Singer sensu auct. eur. — *Conocybe digitalina* (Velen.) Singer sensu auct. eur.

Зростає поодиноко та розсіяними групами на ґрунті, в листяних лісах, іноді на відкритих місцинах (луках, пасовищах, узбіччях доріг), з весни до жовтня. Рідкісний. Неістівний.

Досліджені зразки. Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, НПП "Прип'ять-Стокід", близько 2 км на північний захід від с. Ветли, берег оз. Біле, дубовий ліс, на ґрунті, 51°54'38.3"N, 24°59'57.1"E, 07.10.2020 (KW-M71602), зібр. М.М. Химин.

Інші місцезнаходження в Україні. Донецька обл., Краматорський р-н, НПП "Святі Гори", правий берег р. Сіверський Донець, біля моста до с. Богородичне, узбіччя дороги, на ґрунті, 28.09.2004 (Prydiuk, 2007a, 2015). Львівська обл., Стрийський р-н, НПП "Сколівські Бескиди", Завадківське ПНДВ, буковий ліс, на ґрунті, 21.09.2010 (Prydiuk, 2015; Dudka et al., 2019).

Загальне розповсюдження. Європа: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Словаччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. Африка: Зімбабве, Марокко, Танзанія, Уганда. Азія: Грузія, Індія, Іран, Китайський Тайбей, Кіпр, Росія (Сибір, Далекий Схід). Північна Америка: США. Південна Америка: Аргентина, Болівія, Чилі

(Hausknecht, 2009; Malysheva, 2018; <https://www.gbif.org/species/2529724>).

Conocybe subpubescens за комплексом ознак найближчий до *C. pulchella* (Velen.) Hauskn. & Svrček, але має масивніші плодові тіла та дрібніші спори. Крім того, за спостереженнями мікологів, *C. subpubescens* віддає перевагу лісам, в той час як *C. pulchella* найчастіше зростає на відкритих місцинах (Arnolds, 2005b; Hausknecht, 2009), втім для обох видів відомі й винятки.

***Conocybe subxerophytica* Singer & Hauskn. var. *brunnea* Hauskn.**, Österr. Z. Pilzk., 11: 74. 2002. — Рис. 1G.

Зростає поодиноко та невеликими групами на ґрунті, переважно в сухих відкритих місцинах, рідше в сухих рідколіссях, з червня до жовтня. Рідкісний. Неїстівний.

Досліджені зразки. Хмельницька обл., Шепетівський р-н, НПП "Мале Полісся", східніше с. Голики, берег оз. Святе, сосновий ліс, на ґрунті, 50°12'57.6"N, 26°50'17.3"E, 14.09.2018 (KW-M71601).

Інші місцезнаходження в Україні. Донецька обл., Краматорський р-н, НПП "Святі Гори", східна околиця с. Богородичне, узбіччя дороги, на ґрунті, 01.10.2004 (Prydiuk, 2007b, 2015). Київська обл., Обухівський р-н, околиці с. Трипілля, остепнені луки, на ґрунті, 19.06.2008 (Prydiuk, 2015). Одеська обл., Ізмаїльський р-н, біосферний заповідник "Дунайські Плавні", околиці м. Вилкове, ліс із тополі білої, на ґрунті, 22.10.2009 (Prydiuk, 2015; Dudka et al., 2019). Чернівецька обл., Вижницький р-н, НПП "Вижницький", Солонянське ПНДВ, ур. Стебник, правий берег р. Стебник, узбіччя дороги, на ґрунті, 06.09.2013 (Dudka et al., 2019).

Загальне розповсюдження. Європа: Австрія, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Угорщина, Україна, Швеція (Hausknecht, 2009; <https://www.gbif.org/species/3323200>).

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Arnolds E. 2005a. *Bolbitius* Fr. In: *Flora Agaricina Neerlandica*. Vol. 6. *Bolbitiaceae (Bolbitius, Conocybe, Pholiotina, Agrocybe) and Coprinaceae (I): the genus Coprinus*. Eds M.E. Noordeloos, Th.W. Kuyper, E.C. Vellinga. Boca Raton etc.: Taylor & Francis, pp. 112–119.
- Arnolds E. 2005b. *Conocybe* Fay. In: *Flora Agaricina Neerlandica*. Vol. 6. *Bolbitiaceae (Bolbitius, Conocybe, Pholiotina, Agrocybe) and Coprinaceae (I): the genus Coprinus*. Eds M.E. Noordeloos, Th.W. Kuyper, E.C. Vellinga. Boca Raton, etc.: Taylor & Francis, pp. 120–179.
- Dudka I.O., Heluta V.P., Prydiuk M.P., Tykhonenko Yu.Ya., Akulov O.Yu., Hayova V.P., Zyкова M.O., Andrianova T.V., Dzhagan V.V., Shcherbakova Yu.V. 2019. *Fungi of Reserves and National Nature Parks of the Ukrainian Carpathians*. Kyiv: Naukova Dumka, 214 pp. [Дудка І.О., Гелюта В.П., Придюк М.П., Тихоненко Ю.Я., Акулов О.Ю., Гайова В.П.,

Для *Conocybe subxerophytica* var. *brunnea* характерна темнозабарвлені шапинка, досить густі пластинки, великі виразно приплюснуті спори та присутність на ніжці майже виключно кеглеподібних каулоцистид. Типова варіація цього виду (в Україні ще не знайдена) відрізняється виключно меншими та дещо тендітнішими плодовими тілами не з такими густими пластинками. *Conocybe semiglobata* Kühner & Watling має спори приблизно такого ж розміру, проте вони не приплюснуті (Hausknecht, 2009).

Висновки

Неважаючи на значну кількість видів родини *Bolbitiaceae*, які вдалося виявити в період під час підготовки "Флори грибів України" (Prydiuk, 2015), вона залишається недостатньо дослідженою в Україні. Дані, наведені в нашій статті, свідчать про необхідність подальшого вивчення цієї групи грибів.

Подяки

Автор висловлює щиру вдячність О.М. Балагурі за люб'язно надані зразки та фото *Bolbitius titubans* var. *olivaceus*, М.М. Химину за зібраний зразок *Conocybe subpubescens*, а також співробітникам та керівництву Національних природних парків "Кармелюкове Поділля", "Мале Полісся" та "Прип'ять-Стокід" за допомогу в зборі грибів.

ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ

Автор повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

ORCID

М.П. Придюк:  <https://orcid.org/0000-0001-5083-014X>

- Зикова М.О., Андріанова Т.В., Джаган В.В., Щербакова Ю.В. 2019. Гриби заповідників та національних природних парків Українських Карпат. Київ: Наукова думка, 214 с.].
- Hausknecht A. 2009. *A monograph of the genera Conocybe Fayod and Pholiotina Fayod in Europe*. Alassio: Edizioni Candusso, 968 p.
- Hausknecht A., Vesterholt J. 2012a. *Bolbitius* Fr. In: *Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera*. Eds H. Khudsen, J. Vesterholt. Copenhagen: Nordswamp, pp. 733–735.
- Hausknecht A., Vesterholt J. 2012b. *Conocybe* Fayod. In: *Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera*. Eds H. Khudsen, J. Vesterholt. Copenhagen: Nordswamp, pp. 735–755.
- Malysheva E.F. 2018. *Opredelitel gribov Rossii: Poriadok agarikovye*. Вyp. 2. *Semeystvo bolbitievye*. St. Petersburg: Nestor-Is-toriya, 416 pp. [Малышева Е.Ф. Определитель грибов России: Порядок агариковые. Вып. 2. Семейство болбитеевые. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018, 416 с.].
- Malysheva E.F., Malysheva V.F., Svetasheva T.Yu. 2015. Molecular phylogeny and taxonomic revision of the genus *Bolbitius* (*Bolbitiaceae, Agaricales*) in Russia. *Mycological Progress*, 14(8): 14–64. <https://doi.org/10.1007/s11557-015-1087-2>
- Prydiuk M.P. 2007a. New records of *Conocybe* species from Ukraine. I. The sections *Mixtae* and *Pilosellae*. *Czech Mycology*, 59(1): 25–38. <https://doi.org/10.33585/cmy.59104>
- Prydiuk M.P. 2007b. New records of *Conocybe* species from Ukraine. II. The section *Conocybe*. *Czech Mycology*, 59(1): 39–50. <https://doi.org/10.33585/cmy.59105>
- Prydiuk M.P. 2015. *Flora gribov Ukrayiny. Bolbitievye i koprinoviye griby*. Kyiv: ООО НРР Interservis, 598 pp. [Придюк Н.П. 2015. Флора грибов Украины. Больбитиеевые и коприновые грибы. Киев: ООО НРР Интерсервис, 598 с.].
- Prydiuk M.P. 2019. New and rare for Ukraine taxa of the genera *Conocybe* and *Pholiotina* (*Bolbitiaceae, Basidiomycota*). *Ukrainian Botanical Journal*, 76(4): 344–355. [Придюк М.П. 2019. Нові та рідкісні для України таксони родів *Conocybe* і *Pholiotina* (*Bolbitiaceae, Basidiomycota*). Український ботанічний журнал, 76(4): 344–355]. <https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.04.344>
- Prylutskyi O., Prydiuk M., Malanyuk V., Yakunina V. 2022. Reference-based checklist of gilled Agaricales (*Basidiomycota, Fungi*) from Ukraine. Version 1.8. V. N. Karazin Kharkiv National University. Checklist dataset. (Accessed 27 May 2024). <https://doi.org/10.15468/bgv8hy>
- Watling R. 1982. *British Fungus Flora: Agarics and Boleti 3. Bolbitiaceae: Agrocybe, Bolbitius & Conocybe*. Edinburgh: Her Majesty's Stationery Office, 139 pp.
- Zerova M.Ya., Sosin P.Ye., Rozhenko G.L. 1979. *Vyznachnyk gribiv Ukrayiny*. Vol. 5. *Basydiomitsety*. Book 2. *Boletalni, strobilomit-setalni, trikholomatalni, entolomatalni, rusulalni, agarikalni, gasteromicety*. Kyiv: Naukova Dumka, 565 pp. [Зерова М.Я., Сосін П.Є., Роженко Г.Л. 1979. Визначник грибів України. Т. 5. Базидоміцети. Кн. 2. Болетальні, стробіломітє-тальні, трихоломатальні, ентоломатальні, русулальні, агарикалльні, гастероміцети. Київ: Наукова думка, 565 с.].

**New for Ukraine representatives of the genera
Bolbitius and *Conocybe* (*Bolbitiaceae, Basidiomycota*)**

M.P. PRYDIUK

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine
2 Tereshchenkivska Str., Kyiv 01601, Ukraine

Abstract. The article provides data about finds of some new and rare for Ukraine taxa of the genera *Bolbitius* and *Conocybe*. Two species, *Conocybe ambigua* and *C. rickenii*, and one variety, *Bolbitius titubans* var. *olivaceus*, were found for the first time in Ukraine, while for four species (*Conocybe macrocephala*, *C. macrospora*, *C. subpallida*, and *C. subpubescens*) and one variety, *Conocybe subxerophytica* var. *brunnea*, new localities were recorded. The distribution data in Ukraine and worldwide are presented for all reported taxa. For the new in the country species and varieties, their descriptions and original drawings of the macro- and microscopic features are also provided.

Keywords: *Agaricales, Bolbitius, Conocybe, distribution, new records, rare species, variety*