

УДК 512.534.5

В. Д. Дереч (Вінниця, нац. техн. ун-т)

КЛАСИФІКАЦІЯ СКІНЧЕННИХ НІЛЬНАПІВГРУП, ДЛЯ ЯКИХ ІНВЕРСНИЙ МОНОЇД ЛОКАЛЬНИХ АВТОМОРФІЗМІВ Є ПЕРЕСТАВНОЮ НАПІВГРУПОЮ

A semigroup S is called permutable if $\rho \circ \sigma = \sigma \circ \rho$ for any pair of congruences ρ, σ on S . A local automorphism of the semigroup S is defined as an isomorphism between two subsemigroups of this semigroup. The set of all local automorphisms of a semigroup S with respect to an ordinary operation of composition of binary relations forms an inverse monoid of local automorphisms. In the proposed paper, we present a classification of all finite nilsemigroups for which the inverse monoid of local automorphisms is permutable.

Полугрупа S називається перестановочною, якщо для будь-якої пари конгруенцій ρ, σ на S має місце рівність $\rho \circ \sigma = \sigma \circ \rho$. Локальним автоморфізмом полугрупи S називають ізоморфізм між двома її підполугрупами. Множество всіх локальних автоморфізмів полугрупи S відносительно звичайної операції композиції бінарних відношень образує інверсний моноїд локальних автоморфізмів. В данній статті приведена класифікація конечних нильполугруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є перестановочним.

Напівгрупа S називається інверсною, якщо для будь-якого елемента a існує єдиний елемент a^{-1} такий, що $aa^{-1}a = a$ і $a^{-1}aa^{-1} = a^{-1}$. Відомо (див. [1]), що напівгрупа є інверсною тоді і лише тоді, коли вона регулярна і два її довільні ідемпотенти комутують. Напівгрупа називається моноїдом, якщо вона містить одиницю. Найбільш природним чином інверсний моноїд з'являється у вигляді моноїда всіх локальних автоморфізмів тієї чи іншої математичної структури. (Під локальним автоморфізмом математичної структури розуміють ізоморфізм між її підструктурами.) Нехай S — довільна напівгрупа. Через $L\text{Aut}(S)$ позначимо інверсний моноїд усіх локальних автоморфізмів напівгрупи S . У більшості статей, що стосуються напівгрупи $L\text{Aut}(S)$, розглядається проблема опису таких напівгруп B , що $L\text{Aut}(B) \cong L\text{Aut}(S)$ для даної напівгрупи S . Важливою також є проблема знаходження взаємозв'язків між властивостями напівгрупи S і властивостями інверсної напівгрупи $L\text{Aut}(S)$. Зокрема, у статті [2] (крім іншого) знайдено структуру групи G , для якої інверсний моноїд $L\text{Aut}(G)$ є кліффордовим. У роботі [3] дано опис інверсних напівгруп S , для яких інверсний моноїд усіх локальних автоморфізмів між інверсними піднапівгрупами напівгрупи S є цілком напівпростим або фундаментальним. У статтях [4] і [5] відповідно класифіковано скінченні комутативні напівгрупи, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним, і скінченні комутативні напівгрупи, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є Δ -напівгрупою (тобто напівгрупою, конгруенції якої утворюють ланцюг відносно включення).

Основний результат даної статті — це повна класифікація скінченних нильнапівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним (див. теорему 5).

1. Означення. Термінологія. Формулювання потрібних результатів. Напівгрупа називається переставною, якщо для будь-яких двох її конгруенцій ρ і σ виконується рівність $\rho \circ \sigma = \sigma \circ \rho$, де \circ — позначення композиції бінарних відношень.

Комутативну напівгрупу, кожний елемент якої є ідемпотентом, називають напіврешіткою. Нетривіальну напіврешітку називають примітивною, якщо кожний її ненульовий елемент є атомом.

Нехай S — довільна напівгрупа. Ізоморфізм між піднапівгрупами напівгрупи S називають локальним автоморфізмом напівгрупи S . Множина всіх локальних автоморфізмів напівгрупи S відносно звичайної операції композиції бінарних відношень утворює інверсний моноїд, який ми позначимо через $L \text{Aut}(S)$. Якщо $\xi \in L \text{Aut}(S)$, то через $\text{dom}(\xi)$ і $\text{im}(\xi)$ будемо позначати відповідно область визначення і множину значень локального автоморфізму ξ .

Нехай S — довільна напівгрупа. Решітку всіх її піднапівгруп будемо позначати через $\text{Sub}(S)$. Якщо напівгрупа S містить найменшу непорожню піднапівгрупу (наприклад, одинична підгрупа в групі), то найменшим елементом $\text{Sub}(S)$ вважається саме ця піднапівгрупа. Якщо ж найменшої непорожньої піднапівгрупи в S не існує, то найменшим елементом $\text{Sub}(S)$ будемо вважати порожню множину \emptyset , і в цьому випадку порожнє перетворення є нулем інверсного моноїда $L \text{Aut}(S)$. Якщо $A \in \text{Sub}(S)$, то через Δ_A позначимо відношення рівності на піднапівгрупі A . Зрозуміло, що Δ_A є ідемпотентом моноїда $L \text{Aut}(S)$. Кожний ідемпотент напівгрупи $L \text{Aut}(S)$ має таку форму. Якщо $A \in \text{Sub}(S)$, то через $h(A)$ будемо позначати висоту піднапівгрупи A в решітці $\text{Sub}(S)$.

Нехай S — довільна інверсна напівгрупа перетворень скінченної множини. Якщо $f \in S$, то згідно з класичним означенням $\text{rank}(f) = |\text{im}(f)|$. Таке означення рангу перетворення в багатьох випадках є цілком прийнятним. Проте (взагалі кажучи) воно має низку недоліків. По-перше, при такому означенні ранг не зберігається при автоморфізмі. Для прикладу на множині $\{1, 2, 3\}$ розглянемо такі перетворення: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, \emptyset . Тоді $\text{rank}(\alpha) = 1$,

$\text{rank}(\beta) = 2$, $\text{rank}(\emptyset) = 0$. Зрозуміло, що $\Psi = \begin{pmatrix} \emptyset & \alpha & \beta \\ \emptyset & \beta & \alpha \end{pmatrix}$ є автоморфізмом напіврешітки $\{\emptyset, \alpha, \beta\}$. Як ми бачимо, $(\alpha)\Psi = \beta$, але $1 = \text{rank}(\alpha) \neq \text{rank}(\beta) = 2$. По-друге, таке означення не застосовується, якщо мова йде про інверсну напівгрупу всіх локальних автоморфізмів скінченного лінійного простору. Тобто воно не є універсальним навіть для скінченної інверсної напівгрупи перетворень. По-третє, якщо інверсна напівгрупа містить 0, то доцільно вимагати, щоб $\text{rank}(0) = 0$. Проте для класичного означення це не так. Розглянемо для прикладу інверсну напівгрупу всіх локальних автоморфізмів скінченної групи G . Зрозуміло, що перетворення $\begin{pmatrix} e \\ e \end{pmatrix}$ (де e — одиниця групи G) є нулем інверсного моноїда $L \text{Aut}(G)$. За класичним

означенням рангу $\text{rank}\left(\begin{pmatrix} e \\ e \end{pmatrix}\right) = 1$. Усі перелічені недоліки класичного означення рангу зникають, якщо дати таке означення (див. [7]). Отже, нехай S — інверсна напівгрупа скінченної довжини (відносно звичайного канонічного порядку на S). Якщо $a \in S$, то (за означенням) $\text{rank}(a) = h(aa^{-1})$, де $h(aa^{-1})$ — висота ідемпотента aa^{-1} у напіврешітці $E(S)$. Легко перевірити, що при такому означенні рангу елемента виконується характеристична нерівність, а саме: $\text{rank}(a \cdot b) \leq \min\{\text{rank}(a), \text{rank}(b)\}$. Зазначимо, що таке означення рангу елемента інверсної напівгрупи скінченної довжини в багатьох випадках (наприклад, у випадку скінченної симетричної інверсної напівгрупи) тотожне класичному означенню. Конкретизуємо наше означення рангу для інверсного моноїда $L \text{Aut}(S)$ у випадку, коли S — скінчена напівгрупа. Отже, нехай $f \in L \text{Aut}(S)$, тоді (за означенням) $\text{rank}(f) = h(\text{im}(f))$, де $h(\text{im}(f))$ — висота піднапівгрупи $\text{im}(f)$ у решітці $\text{Sub}(S)$.

Напівгрупа називається уніпотентною, якщо вона містить точно один ідемпотент.

Напівгрупу S , що містить 0, називають нільнапівгрупою, якщо для довільного $x \in S$ існує таке натуральне число n , що $x^n = 0$.

Нехай S — нільнапівгрупа. Визначимо на ній бінарне відношення \leq таким чином: $x \leq y \Leftrightarrow S^1 x S^1 \subseteq S^1 y S^1$. Легко перевірити, що відношення \leq є порядком (не обов'язково стабільним). Цей порядок назовемо канонічним.

Нехай \mathcal{H} — скіченна множина, що містить щонайменше 4 елементи. Нехай 0 і z — два різні фіксовані елементи з множини \mathcal{H} . Визначимо операцію на \mathcal{H} таким чином:

- $0 * x = x * 0 = 0$ для довільного $x \in \mathcal{H}$;
- $x * x = 0$ для будь-якого $x \in \mathcal{H}$;
- якщо $x \neq y$ і $\{x, y\} \cap \{0, z\} = \emptyset$, то $x * y = y * x = z$;
- $x * z = z * x = 0$ для довільного $x \in \mathcal{H}$.

Легко перевірити, що $(\mathcal{H}, *)$ є нільнапівгрупою. Клас таких напівгруп позначимо через \mathcal{N} .

Тепер сформулюємо кілька тверджень, які ми будемо застосовувати у даній статті.

Твердження 1 (див. [6], теорема 2). *Нехай S — інверсна напівгрупа скіченного рангу з нулем. Тоді S є переставною в тому і лише в тому випадку, коли виконуються такі умови:*

- якщо $\text{rank}(a) = \text{rank}(b)$ для будь-яких $a, b \in S$, то $SaS = SbS$;
- для будь-якого $e \in E(S)$ ($\text{rank}(e) \geq 2$) існують ідемпотенти f і g такі, що $f \neq g$, $f < e$, $g < e$ і $\text{rank}(f) = \text{rank}(g) = \text{rank}(e) - 1$.

Зauważення 1 (див. [6], теорема 1). Якщо ранг довільного елемента нетривіальної інверсної напівгрупи S з нулем не перевищує 1, то напівгрупа S переставна тоді і лише тоді, коли вона є напівгрупою Брандта.

Зauważення 2 (див. [7], теорема 2). Зазначимо, що умова 1 твердження 1 еквівалентна лінійній впорядкованості (відносно включення) множини ідеалів напівгрупи S .

Зauważення 3 (див. [6], лема 1). Умовою 2 часто зручніше користуватися в еквівалентній формі. А саме: якщо $u < v$, де $u, v \in E(S)$ і $\text{rank}(u) \geq 1$, то існує елемент $w \in E(S)$ такий, що $u \neq w$, $w < v$ і $\text{rank}(u) = \text{rank}(w)$.

Твердження 2 (див. [8], теорема 1). *Нехай S — скіченна напівгрупа. Множина ідеалів напівгрупи $L \text{Aut}(S)$ лінійно впорядкована відносно включення тоді і тільки тоді, коли в решітці $\text{Sub}(S)$ неізоморфні піднапівгрупи мають різні висоти.*

2. Скіченна в'язка, для якої інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним. Напівгрупа, кожний елемент якої є ідемпотентом, називається в'язкою. В цьому пункті ми класифікуємо скіченні в'язки, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним.

Лема 1. *Якщо скіченна напівгрупа S містить щонайменше два ідемпотенти і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним, то кожний елемент напівгрупи S є ідемпотентом.*

Доведення. Насамперед зазначимо, що найменшим елементом решітки $\text{Sub}(S)$ є порожня множина, тому висота кожного ідемпотента напівгрупи S у решітці $\text{Sub}(S)$ дорівнює одиниці. Припустимо, що напівгрупа S містить елемент a , який не є ідемпотентом. Тоді в решітці $\text{Sub}(S)$ висота циклічної напівгрупи $\langle a \rangle$ не менша за два. Відомо, що кожна скіченна циклічна напівгрупа містить точно один ідемпотент. Позначимо через e ідемпотент, що належить $\langle a \rangle$. Згідно з твердженням 1 (див. також зауваження 3 і твердження 2), існує така піднапівгрупа $B \in \text{Sub}(S)$, що $B \subset \langle a \rangle$, $B \neq \{e\}$ і $B \cong \{e\}$. Отже, піднапівгрупа B є одноелементною і цей елемент є ідемпотентом, який відмінний від e . Таким чином, циклічна напівгрупа $\langle a \rangle$ містить більш ніж один ідемпотент. Суперечність.

Лему 1 доведено.

У статті [8] доведено таку теорему.

Теорема 1. *Нехай S — скінчена в'язка. Інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним в таких і лише в таких випадках:*

- (1) S — лінійно впорядкована напіврешітка;
- (2) S — примітивна напіврешітка;
- (3) S — напівгрупа правих нулів;
- (4) S — напівгрупа лівих нулів.

Із теореми 1 і леми 1 випливає такий результат.

Теорема 2. *Нехай скінчена напівгрупа S містить щонайменше два ідемпотенти. Її інверсний моноїд локальних автоморфізмів $L \text{Aut}(S)$ є переставним тоді і лише тоді, коли S :*

- (1) *або лінійно впорядкована напіврешітка;*
- (2) *або примітивна напіврешітка;*
- (3) *або напівгрупа правих нулів;*
- (4) *або напівгрупа лівих нулів.*

3. Скінчена нільнапівгрупа, що містить піднапівгрупу K_1 і для якої інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним. Наступні дві леми ми віднесемо до математичного фольклору і сформулюємо без доведення.

Лема 2. *Якщо S — скінчена нільнапівгрупа, то $S - S^2$ є найменшою (відносно включення) твірною множиною напівгрупи S .*

Лема 3. *Якщо S — скінчена нільнапівгрупа і $S = S^2$, то $S = \{0\}$.*

Лема 4. *Нехай S — скінчена нільнапівгрупа. Якщо піднапівгрупа A_k містить $k + 1$ елемент, то $h(A_k) = k$.*

Доведення проведемо методом математичної індукції за порядком піднапівгрупи. Очевидно, що $h(\{0\}) = 0$. Припустимо, що для довільної піднапівгрупи A_{k-1} , що містить k елементів, $h(A_{k-1}) = k - 1$. Нехай піднапівгрупа A_k містить $k + 1$ елемент. Якщо $a_k \in A_k - A_k^2$, то (за припущенням) $h(A_k - \{a_k\}) = k - 1$. Отже, $h(A_k) \geq k$. Крім того, очевидно, що $h(A_k) \leq k$. Таким чином, $h(A_k) = k$.

Лему 4 доведено.

Наступна лема дає критерій, за яким ми можемо встановити чи утворюють ідеали інверсного моноїда $L \text{Aut}(S)$ (де S — скінчена нільнапівгрупа) ланцюг відносно включення чи ні.

Лема 5. *Нехай S — скінчена нільнапівгрупа. Множина ідеалів інверсного моноїда $L \text{Aut}(S)$ лінійно впорядкована відносно включення тоді і лише тоді, коли піднапівгрупи напівгрупи S з однаковою кількістю елементів є ізоморфними.*

Доведення безпосередньо випливає з твердження 2 і леми 4.

Лема 6. *Нехай S — скінчена нільнапівгрупа. Інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ задоволяє умову 2 твердження 1 тоді і лише тоді, коли для довільного $x \in S$ виконується рівність $x^2 = 0$.*

Доведення. Припустимо, що $x^2 = 0$ для будь-якого елемента $x \in S$. Нехай $A \in \text{Sub}(S)$, до того ж $|A| \geq 3$. Тоді A не є циклічною піднапівгрупою напівгрупи S , а отже, твірна множина $A - A^2$ (див. лему 2) містить щонайменше два різні елементи a_1 і a_2 . Очевидно, що піднапівгрупи $A - \{a_1\}$ і $A - \{a_2\}$ такі, що $A - \{a_1\} \neq A - \{a_2\}$, $A - \{a_1\} \subset A$, $A - \{a_2\} \subset A$ і $|A - \{a_1\}| = |A - \{a_2\}| = |A| - 1$. Тобто для ідемпотентів інверсного моноїда $L \text{Aut}(S)$ виконується умова 2 твердження 1.

Нехай тепер напіврешітка $\text{Sub}(S)$ задоволяє умову 2 твердження 1. Покажемо, що $x^2 = 0$ для будь-якого елемента $x \in S$. Припустимо протилежне, тобто існує елемент a такий, що циклічна напівгрупа $\langle a \rangle$ містить щонайменше три елементи. Позначимо піднапівгрупу $\langle a \rangle - \{a\}$

через C . Тоді існує (див. зауваження 3) піднапівгрупа $B \subset \langle a \rangle$ така, що $B \neq C$ і $|B| = |C|$. Оскільки $B \subset \langle a \rangle$ і $B \neq \langle a \rangle$, то $B \subset \langle a \rangle - \{a\} = C$. Звідси $B = C$. Суперечність.

Лему 6 доведено.

Леми 5 і 6 дають можливість сформулювати наступне твердження.

Твердження 3. *Нехай S — скінчена нільнапівгрупа. Інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним тоді і лише тоді, коли виконуються такі умови:*

- (i) *для довільного елемента x має місце рівність $x^2 = 0$;*
- (ii) *піднапівгрупи з однаковою кількістю елементів є ізоморфними.*

Лема 7. *Якщо скінчена напівгрупа S є уніпотентною і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним, то напівгрупа S є або групою або нільнапівгрупою.*

Доведення. Позначимо через K найменший ідеал напівгрупи S . Відомо, що K є простою напівгрупою. Проста скінчена напівгрупа є регулярною. Як відомо, регулярна напівгрупа з єдиним ідемпотентом є групою. Якщо K — одноелементна група, то S є нільнапівгрупою. Припустимо тепер, що $|K| \geq 2$ і $K \neq S$. Тоді, згідно з твердженням 1 (див. також зауваження 3), існує піднапівгрупа B така, що $K \neq B$ і $K \cong B$. Позначимо через e ідемпотент напівгрупи S . Зрозуміло, що $e \in K \cap B$. Оскільки B — група, то для довільного елемента $b \in B$ маємо $be = eb = b$. Оскільки $e \in K$, то $b \in K$. Звідси $B = K$. Суперечність. Таким чином, у цьому випадку $K = S$, тобто S — група.

Лему 7 доведено.

Далі ми зосередимося на вивчені структури скінчених нільнапівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним. Перше питання, яке виникає: чи існує скінчена некомутативна нільнапівгрупа, що задовольняє умови (i) і (ii) (див. твердження 3)? Відповідь є ствердною. Наведемо приклад.

Приклад. Розглянемо множини $K_1 = \{0, a, x, y\}$ і $K_2 = \{0, a, b, x, y\}$. На цих множинах задамо операції $*$ і \star за допомогою відповідно таблиць множення.

*	0	a	b	x	y
0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0
x	0	0	0	a	
y	0	0	0	0	

*	0	a	b	x	y
0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0
x	0	0	0	0	a
y	0	0	0	b	0

Легко перевірити, що $(K_1, *)$ і (K_2, \star) є некомутативними нільнапівгрупами. Перелічимо піднапівгрупи визначених напівгруп. Список піднапівгруп напівгрупи K_1 : $0 = \{0\}$, $\alpha = \{0, x\}$, $\beta = \{0, a\}$, $\xi = \{0, y\}$, $\eta = \{0, x, a\}$, $\tau = \{0, y, a\}$, $\sigma = \{0, x, y, a\}$. (Діаграму решітки $\text{Sub}(K_1)$ див. на рис. 1.)

Список піднапівгруп напівгрупи K_2 : $0 = \{0\}$, $\chi = \{0, x\}$, $\alpha = \{0, a\}$, $\beta = \{0, b\}$, $v = \{0, y\}$, $\eta = \{0, x, a\}$, $\tau = \{0, x, b\}$, $\omega = \{0, a, b\}$, $\lambda = \{0, y, a\}$, $\xi = \{0, y, b\}$, $\rho = \{0, x, a, b\}$, $\varphi = \{0, y, a, b\}$, $\sigma = \{0, x, y, a, b\}$. (Діаграму решітки $\text{Sub}(K_2)$ див. на рис. 2.)

Легко перевірити, що кожна власна піднапівгрупа напівгруп K_1 і K_2 є напівгрупою з нульовим множенням. Звідси зрозуміло, що дві власні піднапівгрупи з однаковою кількістю елементів є ізоморфними, тобто виконується умова (ii) твердження 3. Також очевидно, що виконується і умова (i). Отже, інверсні моноїди $L \text{Aut}(K_1)$ і $L \text{Aut}(K_2)$ є переставними.




Рис. 1




Рис. 2

Твердження 4. Нехай некомутативна скінчена нільнапівгрупа S така, що інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Тоді напівгрупа S містить або піднапівгрупу, яка ізоморфна напівгрупі K_1 , або напівгрупу, яка ізоморфна напівгрупі K_2 .

Доведення. Оскільки за умовою напівгрупа S є некомутативною, то існують елементи x і y такі, що $xy \neq yx$.

1-й випадок: $xy = 0$ або $yx = 0$.

Для конкретності нехай $yx = 0$. Тоді чотириелементна множина $\{0, x, y, xy\}$ утворює піднапівгрупу, яка ізоморфна напівгрупі K_1 .

2-й випадок: $xy \neq 0$ і $yx \neq 0$.

Покажемо, що $xyx = 0$. Припустимо, що $xyx \neq 0$. Тоді легко переконатися, що множина $A = \{0, x, xy, xxy\}$ утворює піднапівгрупу, яка ізоморфна K_1 .

Тепер розглянемо множину $B = \{0, xy, yx, xxy\}$. Легко перевірити, що B — напівгрупа з нульовим множенням. Оскільки $|A| = |B|$, то, згідно з лемою 5, $A \cong B$. Суперечність. Таким чином, $xyx = 0$.

Аналогічно можна довести, що $yxy = 0$. Тепер ми можемо стверджувати, що $\{0, x, y, xy, yx\}$ — п'ятиелементна піднапівгрупа напівгрупи S . Легко перевірити, що вона ізоморфна напівгрупі K_2 .

Зазначимо, що напівгрупа K_2 містить чотириелементну піднапівгрупу з нульовим множенням. Тому ситуація, коли напівгрупа S містить і піднапівгрупу, що ізоморфна K_1 , і піднапівгрупу, яка ізоморфна K_2 , є неможливою.

Твердження 4 доведено.

Лема 8. Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу K_1 і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Якщо $xy = yx$, то $xy = 0$.

Доведення. Якщо $x = 0$ або $y = 0$, то твердження леми є очевидним. Якщо $x = y$, то $xy = x^2 = 0$. Нехай тепер $x \neq 0$ і $y \neq 0$. Припустимо, що $xy \neq 0$. Розглянемо множину $\{0, x, y, xy\}$. Очевидно, що $xy \neq x$ і $xy \neq y$. Тобто множина $\{0, x, y, xy\}$ є чотириелементною. Вона утворює комутативну піднапівгрупу. Отже, $\{0, x, y, xy\} \not\cong K_1$, що суперечить твердження 3.

Лему 8 доведено.

Лема 9. Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу K_1 , $S^2 = \{0, a\}$ і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Якщо $x, y \notin S^2$ і $x \neq y$, то виконується еквівалентність $xy = a \Leftrightarrow yx = 0$.

Доведення. Нехай $xy = a$. За умовою $yx = 0$ або $yx = a$. Якщо припустити, що $yx = a$, то $xy = yx = a$, що суперечить лемі 8. Отже, $yx = 0$.

Нехай тепер $yx = 0$. Доведемо, що $xy = a$. Припустимо протилежне, тобто $xy = 0$. Тоді $\{0, a, x, y\}$ — піднапівгрупа з нульовим множенням. Отже, $\{0, a, x, y\} \not\cong K_1$, що суперечить твердженню 3.

Лему 9 доведено.

Лема 10. *Нехай скінчена нільнапівгрупа S складається із n елементами і містить піднапівгрупу, що ізоморфна K_1 . Крім того, інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Тоді $|S - S^2| \geq 3$.*

Доведення. Згідно з лемою 2 множина $S - S^2$ є найменшою твірною множиною напівгрупи S . Розглянемо можливі випадки.

1-й випадок: $|S - S^2| = 1$. Тоді напівгрупа S є моногенною. Оскільки за лемою 6 для довільного x маємо $x^2 = 0$, то в даному випадку $|S| = 2$. Суперечність.

2-й випадок: $|S - S^2| = 2$. Нехай $S - S^2 = \{x, y\}$. Тоді $S = \{0, x, y, xy, yx, xxy, yxy\}$.

Якщо припустити, що $xy = 0$ або $yx = 0$, то $S = \{0, x, y, xy\}$ або $S = \{0, x, y, yx\}$, тобто $|S| \leq 4$. Суперечність.

Нехай тепер $xy \neq 0$ і $yx \neq 0$. Покажемо, що $xxy = 0$ і $yxy = 0$. Припустимо, що $xxy \neq 0$. Розглянемо множину $\{0, xy, yx, xxy\}$. Згідно з лемою 8 $xy \neq yx$. Крім того, $xy \neq xxy$ і $yx \neq xxy$. Отже, $A = \{0, xy, yx, xxy\}$ — чотириелементна піднапівгрупа з нульовим множенням. За умовою напівгрупа S містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_1 . Крім того, $|K_1| = 4$. Отже, згідно з твердженням 3 $A \cong K_1$. Суперечність. Analogічно одержуємо суперечність, якщо припустити, що $yxy \neq 0$.

Якщо ж $xxy = yxy = 0$, то $\{0, x, xy, yx\}$ — чотириелементна піднапівгрупа з нульовим множенням. Очевидно, вона не ізоморфна K_1 , що суперечить твердженню 3.

Лему 10 доведено.

Нехай скінчена нільнапівгрупа P_m така, що:

$|P_m| = m + 4$, де $m \geq 1$;

інверсний моноїд $L \text{Aut}(P_m)$ є переставним;

напівгрупа P_m містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_1 .

Виконаємо такі дії:

1) з напівгрупи P_m вилучимо довільний елемент z_m , що належить твірній множині $P_m - P_m^2$; одержимо піднапівгрупу P_{m-1} ;

2) з напівгрупи P_{m-1} вилучимо довільний елемент z_{m-1} , що належить $P_{m-1} - P_{m-1}^2$; отримаємо піднапівгрупу P_{m-2} .

Аналогічно діємо і далі, аж поки не дійдемо до чотириелементної піднапівгрупи $\{0, a, x, y\}$, яка ізоморфна K_1 . (Далі піднапівгрупу $\{0, a, x, y\}$ позначатимемо через K_1 .)

Розглянемо п'ятиелементну напівгрупу $P_1 = \{0, a, x, y, z_1\}$. Зазначимо, що K_1 є ідеалом напівгрупи P_1 .

Лема 11. У напівгрупі P_1 виконується рівність $az_1 = z_1a = 0$.

Доведення. Якщо $az_1 = x$, то $az_1y = xy = a$. Звідси $a = 0$. Суперечність.

Якщо $az_1 = y$, то $xaz_1 = xy = a$. Звідси $x^2az_1^2 = xaz_1 = a = 0$. Суперечність.

Аналогічно доводимо, що $z_1a \neq x$ і $z_1a \neq y$. Крім того, $az_1 \neq z_1$, $az_1 \neq a$, $z_1a \neq z_1$, $z_1a \neq a$.

Отже, $az_1 = z_1a = 0$.

Лема 12. $P_1^2 = \{0, a\}$.

Доведення. Згідно з лемою 10 $|P_1 - P_1^2| \geq 3$. Зрозуміло, що $0 \notin P_1 - P_1^2$ і $a \notin P_1 - P_1^2$. Звідси $P_1 - P_1^2 = \{x, y, z_1\}$. Отже, $P_1^2 = \{0, a\}$.

Лема 13. Якщо $P_{k-1}^2 = \{0, a\}$, де $k \geq 2$, то $P_k^2 = \{0, a\}$.

Доведення. Очевидно, що $\{0, a\} \subset P_k^2$. Доведемо зворотне включення. Нехай $u, v \in P_k$. Згідно з лемою 10 $|P_k - P_k^2| \geq 3$. Отже, існує такий елемент $w \in P_k - P_k^2$, що $w \neq u$ і $w \neq v$. Піднапівгрупу $P_k - \{w\}$ позначимо через B . Оскільки $|P_{k-1} \cap B| \geq 4$, то існують такі $x_1, x_2 \in P_{k-1} \cap B$, що $x_1 x_2 = a$ і $x_2 x_1 = 0$ (див. лему 9). Отже, $\{0, a\} \subset B^2$. Позаяк $|P_{k-1}| = |B|$, то, згідно з твердженням 3, $P_{k-1} \cong B$. Звідси випливає, що $|P_{k-1}^2| = |B^2|$. Оскільки $P_{k-1}^2 = \{0, a\} \subset B^2$, то $B^2 = \{0, a\}$. Отже, $uv \in \{0, a\}$. Тобто $P_k^2 \subset \{0, a\}$. Таким чином, $P_k^2 = \{0, a\}$.

Лема 14. $P_m^2 = \{0, a\}$.

Доведення. Згідно з лемою 12 $P_1^2 = \{0, a\}$. Крім того, з умови $P_{k-1}^2 = \{0, a\}$ випливає $P_k^2 = \{0, a\}$ (див. лему 13). Використовуючи індукцію, одержуємо $P_m^2 = \{0, a\}$.

Нехай п'ятиелементна нільнапівгрупа $S = \{0, a, x, y, z\}$ така, що:

(i) $\{0, a, x, y\} \cong K_1$ (де $K_1^2 = \{0, a\}$);

(ii) інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним.

Згідно з лемою 14 $S^2 = \{0, a\}$. Тому множина $\{0, a, z\}$ є піднапівгрупою, яка (згідно з твердженням 3) ізоморфна піднапівгрупі $\{0, a, x\}$. Оскільки $\{0, a, x\}$ — напівгрупа з нульовим множенням, то $az = za = 0$.

Всього п'ятиелементних нільнапівгруп, що задовольняють умови (i) та (ii), буде чотири. Наведемо їх:

$*_1$	0	a	x	y	z
0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0
x	0	0	0	a	0
y	0	0	0	0	a
z	0	0	a	0	0

$*_2$	0	a	x	y	z
0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0
x	0	0	0	a	a
y	0	0	0	0	0
z	0	0	0	a	0

$*_3$	0	a	x	y	z
0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0
x	0	0	0	a	a
y	0	0	0	0	a
z	0	0	0	0	0

$*_4$	0	a	x	y	z
0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0
x	0	0	0	a	0
y	0	0	0	0	0
z	0	0	a	a	0

Лема 15. 1. Напівгрупи $(S, *_2)$, $(S, *_3)$, $(S, *_4)$ попарно ізоморфні.

2. $(S, *_1) \not\cong (S, *_4)$.

Доведення. Позначимо через $\psi_{i,j}$ відображення з напівгрупи $(S, *_i)$ у напівгрупу $(S, *_j)$.

Перевірка показує, що функції $\psi_{4,2} = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & z & y & x \end{pmatrix}$ і $\psi_{4,3} = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & y & z & x \end{pmatrix}$ є ізоморфізмами.

Також легко перевірити, що $(S, *_1) \not\cong (S, *_4)$.

Нільнапівгрупу $(S, *_1)$ позначимо через B_1 . Покажемо, що напівгрупа B_1 має екстремальну властивість. А саме, має місце таке твердження.

Твердження 5. Якщо нільнапівгрупа S містить власну піднапівгрупу, ізоморфну B_1 , то інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ не є переставним.

Доведення. Припустимо протилежне, тобто інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Нехай $\{0, a, x, y, z\}$ — множина всіх елементів напівгрупи B_1 , до того ж $B_1^2 = \{0, a\}$ і $B_1 \subset S$. Виберемо довільний елемент $u \in S$ такий, що $u \notin B_1$. Згідно з лемою 14 $S^2 = \{0, a\}$. Звідси випливає, що множина $A = \{0, a, x, y, u\}$ є піднапівгрупою напівгрупи S . Розглянемо всі відображення ψ з B_1 в A такі, що $(0)\psi = 0$ і $(a)\psi = a$. Таких буде 6. Легко перевірити, що відображення

$$\psi_1 = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & x & u & y \end{pmatrix}, \quad \psi_2 = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & y & x & u \end{pmatrix}, \quad \psi_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & u & y & x \end{pmatrix}$$

не є ізоморфізмами. Припустимо, що $\psi_4 = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & x & y & u \end{pmatrix}$ — ізоморфізм, тоді $yu = a$. Розглянемо піднапівгрупу $C = \{0, a, y, z, u\}$. Переглянувши всі шість відображень $\xi: B_1 \rightarrow C$ таких, що $(0)\xi = 0$ і $(a)\xi = a$, переконуємося, що $B_1 \not\cong C$. Одержано суперечність з твердженням 3. Отже, відображення ψ_4 не є ізоморфізмом. Аналогічними міркуваннями приходимо до суперечності з твердженням 3, припустивши, що

$$\psi_5 = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & y & u & x \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \psi_6 = \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & u & x & y \end{pmatrix}$$

є ізоморфізмами. Отже, всі шість відображень $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4, \psi_5, \psi_6$ не є ізоморфізмами. Тобто $A \not\cong B_1$, що суперечить твердженню 3.

Твердження 5 доведено.

Перелічимо всі піднапівгрупи напівгрупи B_1 : $\{0\}, \{0, a\}, \{0, x\}, \{0, y\}, \{0, z\}, \{0, a, x\}, \{0, a, y\}, \{0, a, z\}, \{0, a, x, y\}, \{0, a, x, z\}, \{0, a, y, z\}, \{0, a, x, y, z\}$. Легко перевірити, що будь-які дві піднапівгрупи з однаковою кількістю елементів є ізоморфними. Інверсний моноїд $L \text{Aut}(B_1)$ містить 47 елементів. Група автоморфізмів напівгрупи B_1 (тобто група одиниць моноїда $L \text{Aut}(B_1)$) триелементна:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & x & y & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & y & z & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & x & y & z \\ 0 & a & z & x & y \end{pmatrix}.$$

Вище ми вже показали, що існують лише дві (з точністю до ізоморфізму) п'ятиелементні нільнапівгрупи, які містять напівгрупу K_1 і у яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним. У сенсі твердження 5 нільнапівгрупа B_1 є максимальною. Тепер розглянемо нільнапівгрупу $(S, *_4)$, яка ізоморфна (див. лему 15) напівгрупам $(S, *_2)$ і $(S, *_3)$.

Конструкція 1

Задіямо двоелементну множину $\{0, a\}$. Нехай скінчена множина X така, що $\{0, a\} \cap X = \emptyset$ і $|X| \geq 3$. На X задаємо строгий лінійний порядок $<$. Визначимо бінарну операцію на множині $\{0, a\} \cup X$:

$$\begin{aligned} 0y &= y0 = 0 \text{ для будь-якого } y \in \{0, a\} \cup X; \\ ay &= ya = 0 \text{ для будь-якого } y \in \{0, a\} \cup X; \end{aligned}$$

якщо $x_k, x_m \in X$ і $x_k < x_m$, то $x_k x_m = 0$ і $x_m x_k = a$;
 $z^2 = 0$ для довільного $z \in \{0, a\} \cup X$.

Відносно визначеності операції множина $\{0, a\} \cup X$ стає нільнапівгрупою, яка включає в себе напівгрупу, що ізоморфна нільнапівгрупі $(S, *_4)$.

Щоб переконатися, що інверсний моноїд локальних автоморфізмів напівгрупи $\{0, a\} \cup X$ є переставним, потрібно перевірити виконання умов (i) та (ii) (див. твердження 3). Виконання умови (i) забезпечується за означенням. Щоб перевірити виконання умови (ii), зазначимо, що всі дво- і триелементні піднапівгрупи $\{0, a\} \cup X$ є напівгрупами з нульовим множенням. Очевидно, що такі напівгрупи з однаковою кількістю елементів є ізоморфними. Далі, якщо рівнопотужні піднапівгрупи $\{0, a, x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}\}$ і $\{0, a, x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{km}\}$ містять щонайменше по чотири елементи, до того ж $x_{i1} < x_{i2} < \dots < x_{im}$ і $x_{k1} < x_{k2} < \dots < x_{km}$, то, як легко перевірити, відображення $\begin{pmatrix} 0 & a & x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{im} \\ 0 & a & x_{k1} & x_{k2} & \dots & x_{km} \end{pmatrix}$ є ізоморфізмом. Отже, згідно з твердженням 3 інверсний моноїд $L \text{Aut}(\{0, a\} \cup X)$ є переставним.

Лема 16. *Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, що ізоморфна $(S, *_4)$, і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Тоді напівгрупа S має структуру, опис якої дано в конструкції 1.*

Доведення. Згідно з лемою 14 $S^2 = \{0, a\}$. На множині $S - S^2$ визначимо бінарне відношення Ω таким чином: $(x, y) \in \Omega \Leftrightarrow xy = 0$. Покажемо, що відношення Ω є лінійним порядком. Оскільки для довільного елемента $x \in S$ маємо $x^2 = 0$ (див. твердження 3), то відношення Ω рефлексивне. З леми 9 безпосередньо випливає, що Ω є антисиметричним бінарним відношенням. Доведемо транзитивність відношення Ω . Отже, $xy = 0$ і $yz = 0$. Покажемо, що $xz = 0$. Якщо $x = y$ або $y = z$, то, очевидно, $xz = 0$. Припустимо, що $x \neq y$ і $y \neq z$. Якщо припустити, що $xz = a$, то легко встановити ізоморфізм піднапівгрупи $\{0, a, x, y, z\}$ і напівгрупи $(S, *_1)$. За умовою напівгрупа S містить піднапівгрупу, що ізоморфна $(S, *_4)$. Згідно з лемою 15 $(S, *_1) \not\cong (S, *_4)$. Тобто напівгрупа S містить дві неізоморфні рівнопотужні піднапівгрупи, що суперечить твердженню 3. Таким чином, ми встановили транзитивність бінарного відношення Ω . Отже, Ω — порядок. З леми 9 безпосередньо випливає, що Ω є лінійним порядком. Отже, нільнапівгрупа S має саме таку структуру, опис якої наведено в конструкції 1.

Лему 16 доведено.

Підсумуємо результати третього пункту у вигляді теореми.

Теорема 3. *Нехай нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_1 . Інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним в таких і лише в таких випадках:*

- 1) нільнапівгрупа S ізоморфна K_1 ;
- 2) нільнапівгрупа S ізоморфна B_1 ;
- 3) нільнапівгрупа S має структуру, опис якої наведено у конструкції 1.

4. Скінчена нільнапівгрупа, що містить піднапівгрупу K_2 і для якої інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним.

Лема 17. *Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_2 , і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Якщо $xy = yx$, то $xy = 0$.*

Доведення. Твердження леми є тривіальним у випадку, коли $x = 0$ або $y = 0$, а також у випадку, коли $x = y$. Припустимо тепер, що $x \neq 0, y \neq 0$ і $x \neq y$. Якщо припустити, що $xy \neq 0$, то множина $\{0, x, y, xy\}$ — чотириелементна піднапівгрупа напівгрупи S . Легко перевірити, що

будь-яка чотириелементна піднапівгрупа напівгрупи K_2 є напівгрупою з нульовим множенням. Позаяк піднапівгрупа $\{0, x, y, xy\}$ не є напівгрупою з нульовим множенням, отримуємо суперечність з твердженням 3.

Лема 18. *Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_2 , і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Крім того, $S^2 = \{0, a, b\}$. Якщо $x, y \in S - S^2$ і $x \neq y$, то $xy = a \Leftrightarrow yx = b$.*

Доведення. Нехай $xy = a$. Покажемо, що $yx = b$. Припустимо, що $yx \neq b$, тоді $yx = 0$ або $yx = a$. Нехай $yx = a$, тоді $xy = yx$. Отже, згідно з лемою 17 $xy = 0$. Суперечність.

Тепер припустимо, що $yx = 0$. Легко перевірити, що $\{0, x, y, xy\}$ — чотириелементна піднапівгрупа, яка не є напівгрупою з нульовим множенням. Оскільки будь-яка чотириелементна піднапівгрупа напівгрупи K_2 є напівгрупою з нульовим множенням, то одержуємо суперечність з твердженням 3. Отже, $yx = b$.

Припускаючи $yx = b$, аналогічними міркуваннями одержуємо рівність $xy = a$.

Лема 19. *Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, що ізоморфна K_2 , і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Якщо піднапівгрупа C напівгрупи S така, що $|C| = |S| - 1$ і $|C^2| = 3$, то $S^2 = C^2$.*

Доведення. Нехай $S = C \cup \{z\}$, $C = \{0, a, b, x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $C^2 = \{0, a, b\}$.

1. Якщо $x_i z = z$, то $0 = x_i^2 z = x_i z = z$. Суперечність. Аналогічно приходимо до суперечності у випадках, коли $x_i z = x_i$, $zx_i = x_i$, $zx_i = z$.

2. Припустимо, що $x_i z = x_j$, де $x_i \neq x_j$. Згідно з твердженням 3 піднапівгрупа $\{0, a, b, x_i, x_j\}$ ізоморфна K_2 . Звідси $x_i x_j = a$ і $x_j x_i = b$ (або $x_j x_i = a$ і $x_i x_j = b$). Позаяк $x_i z = x_j$, то $0 = x_i^2 z = x_i x_j = a$. Суперечність. Аналогічно отримуємо суперечність, якщо $zx_i = x_j$. Отже, для довільного x_i , $i = 1, 2, \dots, k$, $zx_i \in C^2$ і $x_i z \in C^2$.

3. Припустимо, що $az = x_i$. Якщо $x_i x_j = a$, то $az x_j = x_i x_j = a$. Звідси $0 = a(zx_j)^2 = az x_j = a$. Суперечність. Припустимо тепер, що $x_i x_j = b$. Тоді $az x_j = x_i x_j = b$. Оскільки $zx_j \in C^2$, то $b = 0$. Суперечність. Аналогічно приходимо до суперечності у випадку, коли $za \in \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, або $bz \in \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, або $zb \in \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

Робимо остаточний висновок: $S^2 = C^2 = \{0, a, b\}$.

Лема 20. *Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_2 , і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Тоді $|S^2| = 3$.*

Доведення. Нехай $S = S_n$, до того ж $|S_n| = 5 + n$ (де $n \geq 0$). З напівгрупи S_n вилучаємо елемент a_n (де $a_n \in S_n - S_n^2$). Одержано піднапівгрупу S_{n-1} . З піднапівгрупи S_{n-1} вилучаємо елемент a_{n-1} (де $a_{n-1} \in S_{n-1} - S_{n-1}^2$). Одержано піднапівгрупу S_{n-2} . І так далі. Таким чином отримуємо ланцюг піднапівгруп $S_0 \subset S_1 \subset S_2 \subset \dots \subset S_{n-1} \subset S_n = S$, де $S_0 \cong K_2$, $|S_i| = |S_{i-1}| + 1$, $i = 1, 2, \dots, n$. Далі застосовуємо лему 19. Одержано $S^2 = S_0^2$. Отже, $|S^2| = 3$.

Лема 21. *Нехай скінчена нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_2 , і інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Тоді $S^3 = \{0\}$.*

Доведення. Згідно з лемою 20 $S^2 = \{0, a, b\}$. Легко показати, що для будь-якого $x \in S$ рівності $ax = a$, $xa = a$, $xb = b$, $bx = b$ неможливі. Припустимо, що $ax = b$. Оскільки $a \in S^2$, то існують такі $u, v \in S$, що $a = uv$. Отже, $(uv)x = u(vx) = b$. Припустимо, що $vx = b$, тоді $ub = b$. Звідси $0 = u^2 b = ub = b$. Суперечність. Якщо $vx = a$, то $b = ax = vx^2 = 0$. Суперечність. Тобто $ax \neq b$. Аналогічно доводимо, що $xa \neq b$, $xb \neq a$, $bx \neq a$. Таким чином, $\{0, a, b\} \cdot S = S \cdot \{0, a, b\} = \{0\}$.

Нехай шестиелементна нільнапівгрупа $S = \{0, a, b, x, y, z\}$ така, що:

- 1) $\{0, a, b, x, y\} \cong K_2$ (де $K_2^2 = \{0, a, b\}$);
- 2) інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним.

Згідно з лемою 21 $az = za = zb = bz = 0$. Далі, припустимо, що $xz = 0$. Тоді (згідно з лемою 18) $zx = 0$. Отже, $\{0, a, b, x, z\}$ є напівгрупою з нульовим множенням. Тобто $\{0, a, b, x, z\} \not\cong K_2$, що суперечить твердженню 3. Таким чином, $xz \in \{a, b\}$. Аналогічно, $yz \in \{a, b\}$. Подібним чином ми також доводимо, що $zx \in \{a, b\}$ і $zy \in \{a, b\}$. Звідси робимо висновок: існують чотири шестиелементні нільнапівгрупи, що задовольняють умови 1 і 2, а саме:

\star_1	0	a	b	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
x	0	0	0	0	a	a
y	0	0	0	b	0	a
z	0	0	0	b	b	0

\star_3	0	a	b	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
x	0	0	0	0	a	b
y	0	0	0	b	0	b
z	0	0	0	a	a	0

\star_2	0	a	b	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
x	0	0	0	0	a	b
y	0	0	0	b	0	a
z	0	0	0	a	b	0

\star_4	0	a	b	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0
x	0	0	0	0	a	a
y	0	0	0	b	0	b
z	0	0	0	b	a	0

Лема 22. 1. Напівгрупи (S, \star_1) , (S, \star_3) , (S, \star_4) попарно ізоморфні.

2. $(S, \star_1) \not\cong (S, \star_2)$.

Доведення. Позначимо через $\xi_{i,j}$ відображення з напівгрупи (S, \star_i) у напівгрупу (S, \star_j) .

Перевірка показує, що функції $\xi_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & z & x & y \end{pmatrix}$, $\xi_{1,4} = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & x & z & y \end{pmatrix}$ є ізоморфізмами.

Також легко перевірити, що $(S, \star_1) \not\cong (S, \star_2)$.

Нільнапівгрупу (S, \star_2) позначимо через B_2 .

Твердження 6. Якщо нільнапівгрупа S містить власну піднапівгрупу, яка ізоморфна B_2 , то інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ не є переставним.

Доведення. Припустимо протилежне, тобто інверсний моноїд $L \text{Aut}(S)$ є переставним. Нехай $\{0, a, b, x, y, z\}$ – усі елементи напівгрупи B_2 , до того ж $B_2^2 = \{0, a, b\}$ і $B \subset S$. Виберемо довільний елемент $u \in S$ такий, що $u \notin B_2$. Згідно з лемою 20 $S^2 = \{0, a, b\}$. Звідси випливає, що множини $A = \{0, a, b, x, y, u\}$ і $C = \{0, a, b, x, z, u\}$ є піднапівгрупами напівгрупи S . Якщо відображення φ таке, що $(\{0, a, b\})\varphi \neq \{0, a, b\}$, то $\varphi \notin L \text{Aut}(S)$. Розглянемо часткові перестановки:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & x & y & u \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & x & u & y \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & y & x & u \end{pmatrix},$$

$$\xi_4 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & y & u & x \end{pmatrix}, \quad \xi_5 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & u & x & y \end{pmatrix}, \quad \xi_6 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & u & y & x \end{pmatrix}.$$

Легко перевірити, що відображення ξ_2, ξ_3, ξ_6 не є ізоморфізмами. Припустимо, що ξ_1 – ізоморфізм. Тоді $xu = b$ і $yu = a$. Переглянувши всі 12 відображень $\eta: B_2 \rightarrow C$ таких, що $(0)\eta = 0$ і $(\{a, b\})\eta = \{a, b\}$, переконуємося, що кожне з них не є ізоморфізмом. Тобто $B_2 \not\cong C$, що суперечить твердженню 3. Отже, відображення ξ_1 не є ізоморфізмом. Таким же чином ми переконуємося, що $\xi_4 \notin L \text{Aut}(S)$ і $\xi_5 \notin L \text{Aut}(S)$. Отже, відображення $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6$ не є ізоморфізмами. Далі, розглянемо такі відображення:

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & u & y & x \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & y & u & x \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & u & x & y \end{pmatrix},$$

$$\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & x & u & y \end{pmatrix}, \quad \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & y & x & u \end{pmatrix}, \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & x & y & u \end{pmatrix}.$$

Безпосередня перевірка показує, що відображення $\lambda_2, \lambda_3, \lambda_6$ не є ізоморфізмами. Припустимо, що $\lambda_i, i = 1, 4, 5$, є ізоморфізмом, тоді (як легко перевірити) $\xi_i, i = 1, 4, 5$, – ізоморфізм. Суперечність. Таким чином, $B_2 \not\cong A$, що суперечить твердженню 3.

Твердження 6 доведено.

Перелічимо всі піднапівгрупи нільнапівгрупи B_2 : $\{0\}, \{0, a\}, \{0, b\}, \{0, x\}, \{0, y\}, \{0, z\}, \{0, a, b\}, \{0, a, x\}, \{0, a, y\}, \{0, a, z\}, \{0, b, x\}, \{0, b, y\}, \{0, b, z\}, \{0, a, b, x\}, \{0, a, b, y\}, \{0, a, b, z\}, \{0, a, b, x, y\}, \{0, a, b, x, z\}, \{0, a, b, y, z\}, \{0, a, b, x, y, z\}$. Зазначимо, що всі піднапівгрупи, порядок яких не перевищує 4, є напівгрупами з нульовим множенням. Легко перелічити всі ізоморфізми між такими піднапівгрупами. Список локальних ізоморфізмів, ранг яких дорівнює 4, є таким:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y \\ 0 & a & b & x & y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y \\ 0 & b & a & y & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y \\ 0 & a & b & y & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y \\ 0 & b & a & z & y \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y \\ 0 & a & b & z & x \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y \\ 0 & b & a & x & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & z \\ 0 & a & b & x & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & z \\ 0 & b & a & z & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & z \\ 0 & a & b & y & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & z \\ 0 & b & a & x & y \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & x & z \\ 0 & a & b & z & y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & z \\ 0 & b & a & y & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & y & z \\ 0 & a & b & y & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & y & z \\ 0 & b & a & z & y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & y & z \\ 0 & a & b & x & y \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & y & z \\ 0 & b & a & y & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & y & z \\ 0 & a & b & z & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & y & z \\ 0 & b & a & x & z \end{pmatrix}.$$

Перелічимо всі автоморфізми напівгрупи B_2 :

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & x & y & z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & y & z & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & a & b & z & x & y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & y & x & z \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & z & y & x \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & a & b & x & y & z \\ 0 & b & a & x & z & y \end{pmatrix}.$$

Група $\text{Aut}(B_2)$ некомутативна і містить шість елементів. Отже, вона ізоморфна симетричній групі S_3 . Інверсний моноїд $L\text{Aut}(B_2)$ містить 202 елементи.

Вище ми вже показали, що існують лише дві (з точністю до ізоморфізму) шестиелементні нільнапівгрупи, які містять напівгрупу K_2 і у яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним. У сенсі твердження 6 нільнапівгрупа B_2 є максимальною. Тепер розглянемо нільнапівгрупу (S, \star_1) , яку далі позначатимемо через D_1 .

Конструкція 2

Зафіксуємо триелементну множину $\{0, a, b\}$. Нехай скінченна множина X така, що $\{0, a, b\} \cap X = \emptyset$ і $|X| \geq 3$. На X задаємо строгий лінійний порядок $<$. Визначимо бінарну операцію на множині $\{0, a, b\} \cup X$:

$$\begin{aligned} 0y &= y0 = 0 \text{ для будь-якого } y \in \{0, a, b\} \cup X; \\ ay &= ya = 0 \text{ для будь-якого } y \in \{0, a, b\} \cup X; \\ by &= yb = 0 \text{ для будь-якого } y \in \{0, a, b\} \cup X; \\ \text{якщо } x_k, x_m \in X \text{ і } x_k < x_m, \text{ то } x_k x_m &= a \text{ і } x_m x_k = b; \\ z^2 &= 0 \text{ для довільного } z \in \{0, a, b\} \cup X. \end{aligned}$$

Відносно визначені операції множина $\{0, a, b\} \cup X$ стає нільнапівгрупою, яка включає в себе напівгрупу, що ізоморфна нільнапівгрупі D_1 .

Для того щоб переконатися, що інверсний моноїд локальних автоморфізмів напівгрупи $\{0, a, b\} \cup X$ є переставним, потрібно перевірити виконання умов (i) та (ii) (див. твердження 3). Виконання умови (i) забезпечується за означенням. Щоб перевірити виконання умови (ii), зазначимо, що всі піднапівгрупи напівгрупи $\{0, a, b\} \cup X$, що містять не більше чотирьох елементів, є напівгрупами з нульовим множенням. Очевидно, що такі напівгрупи з однаковою кількістю елементів є ізоморфними. Далі, якщо рівнопотужні піднапівгрупи $\{0, a, b, x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}\}$ і $\{0, a, b, x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{km}\}$ містять щонайменше п'ять елементів, до того ж $x_{i1} < x_{i2} < \dots < x_{im}$ і $x_{k1} < x_{k2} < \dots < x_{km}$, то легко перевірити, що відображення

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b & x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{im} \\ 0 & a & b & x_{k1} & x_{k2} & \dots & x_{km} \end{pmatrix}$$

є ізоморфізмом. Отже, згідно з твердженням 3 інверсний моноїд $L\text{Aut}(\{0, a, b\} \cup X)$ є переставним.

Лема 23. *Нехай скінченна нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, що ізоморфна (S, \star_1) , і інверсний моноїд $L\text{Aut}(S)$ є переставним. Тоді напівгрупа S має структуру, опис якої дано в конструкції 2.*

Доведення. Вище ми вже домовилися нільнапівгрупу (S, \star_1) позначати через D_1 . Нехай $\{0, a, b, x, y, z\}$ – елементи напівгрупи D_1 . Згідно з лемою 20 $S^2 = \{0, a, b\}$. На множині $S - S^2$ визначимо бінарне відношення η таким чином: $(u, v) \in \eta \Leftrightarrow uv = a$. Покажемо транзитивність відношення η . Отже, нехай $uv = a$ і $vw = a$. Доведемо, що $uw = a$. Припустимо протилежне, тобто $uw \neq a$. Тоді $uw = 0$ або $uw = b$. Якщо $uw = 0$, то $\{0, a, b, u, w\} \not\cong K_2$, що суперечить твердження 3. Припустимо, що $uw = b$. Розглянемо всі відображення $f: D_1 \rightarrow \{0, a, b, u, v, w\}$ такі, що $(0)f = 0$, $(a)f = a$, $(b)f = b$. Таких відображень буде 6. Легко переконатися, що кожне

таке відображення не є ізоморфізмом. Також легко перевірити, що кожне відображення $\xi : D_1 \rightarrow \{0, a, b, u, v, w\}$, де $(0)\xi = 0, (a)\xi = b, (b)\xi = a$, не є ізоморфізмом. Отже, ми одержуємо суперечність з твердженням 3. Таким чином, бінарне відношення η є транзитивним. На підставі леми 18 зазначимо ще одну властивість відношення η : якщо $(l, r) \in \eta$, то $(r, l) \notin \eta$. Отже, бінарне відношення $\eta \cup \Delta$, де Δ – відношення рівності на $S - S^2$, є лінійним порядком. Таким чином, нільнапівгрупа S має саме таку структуру, опис якої дано в конструкції 2.

Лему 23 доведено.

Підсумуємо результати четвертого пункту у вигляді теореми.

Теорема 4. *Нехай скінченна нільнапівгрупа S містить піднапівгрупу, яка ізоморфна K_2 .*

Інверсний моноїд $L\text{Aut}(S)$ є переставним в таких і лише в таких випадках:

- 1) нільнапівгрупа S ізоморфна K_2 ;
- 2) нільнапівгрупа S ізоморфна B_2 ;
- 3) нільнапівгрупа S має структуру, опис якої дано у конструкції 2.

Враховуючи основну теорему статті [4], отримуємо повну класифікацію скінчених нільнапівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним.

Теорема 5. *Нехай S – скінченна нільнапівгрупа. Інверсний моноїд $L\text{Aut}(S)$ є переставним в таких і лише в таких випадках:*

- 1) нільнапівгрупа S є напівгрупою з нульовим множенням;
- 2) нільнапівгрупа S належить класу \mathcal{N} (див. п. 1);
- 3) нільнапівгрупа S ізоморфна K_1 ;
- 4) нільнапівгрупа S ізоморфна B_1 ;
- 5) нільнапівгрупа S має структуру, опис якої дано у конструкції 1;
- 6) нільнапівгрупа S ізоморфна K_2 ;
- 7) нільнапівгрупа S ізоморфна B_2 ;
- 8) нільнапівгрупа S має структуру, опис якої дано у конструкції 2.

Література

1. Клиффорд А., Престон Г. Алгебраическая теория полугрупп: В 2 т. – М.: Мир, 1972. – Т. 1. – 286 с. – Т. 2. – 422 с.
2. Либих А. Л. Инверсные полугруппы локальных автоморфизмов абелевых групп // Исследования по алгебре. – 1973. – Вып. 3. – С. 25–33.
3. Goberstein S. M. Inverse semigroups with certain types of partial automorphism monoids // Glasgow Math. J. – 1990. – **32**. – Р. 189–195.
4. Дереч В.Д. Класифікація скінчених комутативних напівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним // Укр. мат. журн. – 2012. – **64**, № 2. – С. 176–184.
5. Дереч В.Д. Класифікація скінчених комутативних напівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є Δ -напівгрупою // Укр. мат. журн. – 2015. – **67**, № 7. – С. 895–901.
6. Дереч В.Д. Характеристика напіврешітки ідемпотентів переставної інверсної напівгрупи скінченного рангу з нулем // Укр. мат. журн. – 2007. – **59**, № 10. – С. 1353–1362.
7. Дереч В.Д. Конгруенції переставної інверсної напівгрупи скінченного рангу // Укр. мат. журн. – 2005. – **57**, № 4. – С. 469–473.
8. Дереч В.Д. Структура скінченної комутативної інверсної напівгрупи і скінченної в'язки, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставним // Укр. мат. журн. – 2011. – **63**, № 9. – С. 1218–1226.

Одержано 19.08.15