

УДК 574.5(269):582.4(083)

ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ЛАТЕНТНОГО ПОКАЗНИКА ПРИСТОСОВУВАНОСТІ (ЗЛПП) ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВНЕСКУ ДЕЯКІХ ПОКАЗНИКІВ ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ ПОПУЛЯЦІЙ *DESCHAMPSIA ANTARCTICA* ОСТРОВА ГАЛІНДЕЗ (МОРСЬКА АНТАРКТИКА) В СЕЗОН 2017/2018

І. Ю. ПАРНІКОЗА^{1,2}, Н. Ю. МІРЮТА^{1,2}, В. Ю. ІВАНЕЦЬ¹, Є. О. ДИКІЙ¹

¹ Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України
Україна, 01601, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16

² Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Україна, 03143, Київ, вул. Академіка Заболотного, 150
e-mail: ivan.parnikoza@uac.gov.ua

Мета роботи полягала у визначенні показника комплексної адаптивності — зведеного латентного показника пристосуваності (ЗЛПП) для дослідних популяцій *Deschampsia antarctica* É. Desv. Острова Галіндез та оцінці внеску у цей показник таких факторів довкілля, як температура поверхні та вміст органогенів у ґрунті. **Матеріали і методи.** Визначення ЗЛПП проведено на основі попарного порівняння різниць між популяціями за дослідженими параметрами із застосуванням математичного методу реgresії. Температура поверхні ґрунту вимірювалася логерами протягом квітня 2017 р. — квітня 2018 р. **Результати та висновки.** Охарактеризовано температурні коливання впродовж грудня 2017 р. — лютого 2018 р. для дванадцяти дослідних популяцій *D. antarctica* та ділянки угрупування торф'яністих мохів острова Галіндез, Аргентинських островів, Морська Антарктика. Показано значні варіації середньодобової температури поверхні ґрунту впродовж дослідженого періоду між популяціями, особливо у грудні та січні. На основі вимірювань для сезону 2017/18 рр. показників проективного покриття, морфометричних показників генеративних рослин та вмісту білків насіння розраховано значення ЗЛПП *D. antarctica* для даного сезону. Розраховано значення зведеного показника впливу температури для літніх місяців сезону (ЗЛВТ) та зведеного показника впливу вмісту органогенів ґрунту (ЗЛВГ) на окремі параметри пристосуваності рослин *D. antarctica*. Показано, що ЗЛВТ має достовірний внесок у ЗЛПП в грудні і січні, в момент найбільшої варіації температури. ЗЛВГ має достовірний внесок у ЗЛПП лише у сумі із ЗЛВТ.

Ключові слова: *Deschampsia antarctica*, зведений латентний показник пристосуваності (ЗЛПП), внесок температури поверхні та вмісту органогенів ґрунту у комплексну адаптивність.

Вступ. Проблема впливу глобальних змін на екосистеми планети є однією з найважливіших проблем людства. Найсильніше такі зміни відчуваються в полярних регіонах, біота яких є найбільш чутливою до найменших впливів довкілля. Вивчення реакції на зміни клімату є одним з пріоритетів сучасних антарктичних досліджень (Kennicutt et al., 2014). Ця проблематика зафікована і в Державній цільовій науково-технічні програмі проведення дослідження в Антарктиці на 2011–2020 рр. Попереднє вивчення реакції кліматичних змін на індикаторні компоненти наземних систем, таких як судинні рослини, здійснювалися на основі регулярного повторного обстеження одних і тих же са- мих районів та обрахунку кількості та чисельності популяцій (Fowbert, Smith, 1994; Parnikoza et al., 2009; Torres-Mellado et al., 2011).

Визнаючи необхідність продовження таких досліджень, необхідно зазначити, що раніше застосовані методики в повній мірі не дають зможи оцінити реакцію наземних екосистем на зміни довкілля.

Зважаючи на це, нами розробляється підхід щодо щорічної оцінки впливу чинників антарктичного довкілля на основі мережі доступних дослідних популяцій моніторингового полігона острова Галіндез.

Раніше нами запропоновано оцінку комплексної адаптивності для популяцій індикаторного злаку *D. antarctica* у природі на основі комплексного показника — зведеного латентного показника пристосуваності (ЗЛПП) (Parnikoza et al., 2015). Це дозволяє оцінювати комплексну пристосуваність, як в динаміці антарктичних сезонів (Мірюта та ін., 2015, 2017а), так і в умовах стандартизованого вирощування *in vitro* (Парнікова та ін., 2017, Мірюта та ін., 2017б). Термін «латентний» означає, що зведений показник для конкретного сезону є результатом адаптації рослин до суми абіотичних та біотичних умов, які залишаються детально не описаними, тобто латентними. Спроби відшукати безпосередній зв'язок між показниками довкілля — зокрема метеорологічними параметрами та показниками адаптивності є вкрай утрудненими неможливістю практичної реєстрації останніх з невеликим часовим діапазоном. Зважаючи на це, необхідно оцінювати внесок обрахів вимірюваних показників довкілля у поточне значення ЗЛПП, як сумарний результат конкретного сезону. При цьому потрібно застосовувати дискретний підхід, тобто використання даних отриманих для кожної популяції окремо. Зважаючи на це, метою даного дослідження було визначення показника комплексної пристосуваності — ЗЛПП для низки дослідних популяцій *D. antarctica* та оцінка внеску у цей показник таких факторів довкілля, як температура поверхні та вміст органогенів у ґрунті.

Матеріали і методи

У дослідженні були задіяні наступні популяції *D. antarctica* острова Галіндез, архіпелагу Аргентинських островів, Морська Антарктика: **D1** — популяція на берегових скелях Маріна Пойнт біля метеостанції, 65.244780, 64.255800; **D2** — популяція на Маріна Пойнт біля головного приміщення станції, 65.245700, 64.256400; **D3** — популяція на вежі Леопарда, Пінгвін Пойнт, 65.247500, 64.241200; **D4** — популяція на скелі Корабель,

Пінгвін Пойнт, 65.248600, 64.238230; **D5** — популяція на верхній терасі куполу Говорухи під г. Анни, 65.248260; 64.245240; **D6** — популяція біля точки поширення *Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl. на хребті Розточчя, 65.247990, 64.242720; **D7** — скеля Крапля, 65.247017, 64.243167; **D8** — популяція під дизельною, 65.245896, 64.257368; **D9** — популяція на скельному березі гребеня Шия за великим магнітним павільйоном, 65.245467, 64.249867; **D10** — популяція на мисі Магніт, 65.245067, 64.252583; **D11** — популяція на Цвінтарному нагір'ї поблизу павільйону надзвичайно низьких частот (ННЧ); 65.246170, 64.248250; **D12** — популяція на схили Мартинячої вежі на Стелла Пойнт, 65.247450, 64.252740, а також **C** — контрольна ділянка, 65.247635°, 64.250836°, розташована на моховому банку Сміта — фрагмент угроповання торф'янистих мохів *Polytrichum strictum* Bridel, J. Bot. (Schradler) — *Chorisodontium aciphyllum* Brotherus.

Між куртинами рослин у дослідних популяціях *D. antarctica* та контрольній ділянці було розміщено логери НОВО UA-002-64, виставлені на виміри температури поверхні ґрунту з інтервалом 30 хв. Логери працювали з 09.04.17 по 06–07.04.2018 р. У дослідженні використовували також раніше отримані нами дані щодо вмісту головних елементів — органогенів у ґрунтах з відповідних локалітетів дослідних популяцій (Parnikoza et al., 2016).

В якості показників пристосуваності популяцій за методологією, описаною раніше (Parnikoza et al., 2015), вивчали площу проективного покриття та морфометричні показники (довжина листка, довжина суцвіття, довжина квітки, кількість квіток у суцвітті), а також спектри запасних і захисних білків насіння, яке відбирали з п'яти суцвіть, взятих від представників кожної популяції. Методами прикладної статистики на основі цих параметрів пристосуваності було отримано зведений латентний показник пристосуваності (ЗЛПП) для сезону 2017/2018 рр., як відбиток конкретних умов мікрорадіовища кожної з досліджених популяцій. Для цього використовували набір методів та ідеологію, описані в роботах (Мірюта та ін., 2017а, б).

В нашій роботі ми використали поняття зведеного латентного показника (Айвазян та ін., 1989), для випадку комплексної пристосуваності популяцій. При цьому зведений латентний показник пристосованості (ЗЛПП) — характери-

зує реакцію низки показників пристосуваності популяції рослин *D. antarctica* на весь комплекс зовнішніх умов, які залишаються невиміряними, тобто латентними. Проте, маючи дані щодо температури поверхні та вмісту органогенів у ґрунтах, можна спробувати оцінити їх внесок у формування комплексної пристосуваності протягом сезону. Для цього порівнювали ряди даних: ряди значень попарних різниць середньомісячної температури поверхні ґрунту для літніх місяців сезону (грудень, січень, лютий) та ряди попарних різниць чотирьох морфометричних показників, вмісту п'яти фракцій захисних та запасних білків насіння, проективного покриття, визначених для рослин, зібраних в кінці сезону. Усього було вивчено 110 рослин.

Для пошуку залежності вивчених показників пристосуваності від температури поверхні та вмісту органогенів у ґрунті для поточного сезону робили екстремальне групування для кожної з площин, де на вісь у було нанесено окремо: просторові різниці популяцій за чотирма морфометричними ознаками, п'ятьма групами захисних і запасних білків насіння та проективним покриттям, на вісь x: просторові різниці температур поверхні ґрунту чотирьох літніх місяців окремо; або на вісь у було нанесено просторові різниці популяцій за проективним покриттям, на вісь x: просторові різниці вмісту чотирьох органогенів окремо. На основі екстремального групування та виявлених кореляцій (позитивних та негативних у сформованих групах) за методикою детально описанаю в (Parnikova et al., 2015; Miryuta et al., 2017a) визначали сумарну імовірність потрапляння у позитивну чи негативну групу для кожної популяції, яка характеризувала внесок відповідного фактора (температури чи вмісту відповідного органогена) у досліджував-

ний процес формування рослин (морфометрія) та відносного вмісту захисних та запасних білків насіння. Внесок температури поверхні ґрунту був названий нами зведенім показником впливу температури (ЗПВТ), його вирахували для 11 популяцій, внесок вмісту органогенів ґрунтів названий зведенім показником впливу вмісту органогенів у ґрунті (ЗПВГ) вирахували для 10 популяцій. Вплив цих параметрів впродовж усього часу дослідження не був однорідним. Тому ми визначали зведені показники впливу температури для кожного місяця окремо: ЗПВТ₁, ЗПВТ₂, ЗПВТ₃, де T₁ — середня температура у грудні 2017 р., T₂ — у січні 2018 р., T₃ — у лютому 2018 р. Також визначали результичний зведені показники впливу температури ЗПВТ_c = (ЗПВТ₁+ЗПВТ₂+ЗПВТ₃)/3). Внесок зведеного показника впливу вмісту органогенів у ґрунті (ЗПВГ) розглядали як окремо, так і сумарно з температурним за весь сезон: ЗПВТ_c + ЗПВГ = ЗПВТ_cГ.

Результати та обговорення

Аналіз первинних даних щодо значень середньодобової температури поверхні ґрунту для всіх досліджених популяцій *D. antarctica* та контрольної ділянки угруповання торф'янистих мохів впродовж кожного з чотирьох літніх місяців дослідженого сезону виявив деякі відмінні (табл. 1). У випадку контрольної ділянки показники середньомісячної температури поверхні були нижчими за такі для більшості досліджених площинок *D. antarctica*. Проте, для популяції D6 протягом грудня вони були порівняно нижчими, ніж в інших популяцій та контрольної ділянки, що, ймовірно, пояснюється тривалим заляганням тут снігу.

Таблиця 1. Показники температури поверхні ґрунту, виміряні впродовж грудня 2017 – лютого 2018 рр. для ділянок зростання досліджених популяцій *D. antarctica* та контрольної ділянки угруповання торф'янистих мохів, остров Галіндез: дані у комірках таблиці: середнє значення ± стандартне відхилення/дисперсія

Популяція	Середня температура грудня 2017 р., °C*	Діапазон температур грудня 2017 р., °C	Середня температура січня 2018 р., °C	Діапазон температур січня 2018 р., °C	Середня температура лютого 2018 р., °C	Діапазон температур лютого 2018 р., °C
D1	5.7 ± 2.7/7.5	0.3–10.5	5.4 ± 2.1/4.6	1.3–9.0	4.1 ± 1.6/2.7	1.7–7.4
D2	4.1 ± 2.5/6.1	0.2–8.5	4.5 ± 2.0/4.1	0.1–8.2	4.2 ± 1.8/3.4	1.2–7.8
D3	5.8 ± 2.6/7.0	0.3–10.4	5.2 ± 2.2/5.0	0.1–8.4	3.9 ± 1.4/2.0	1.6–6.6
D4	4.9 ± 2.7/7.5	-0.2–9.7	4.3 ± 2.1/4.3	0.1–8.2	3.6 ± 1.8/3.1	0.9–9.1

Популяція	Середня температура грудня 2017 р., °C*	Діапазон температур грудня 2017 р., °C	Середня температура січня 2018 р., °C	Діапазон температур січня 2018 р., °C	Середня температура лютого 2018 р., °C	Діапазон температур лютого 2018 р., °C
D5	6.8 ± 3.4/11.6	0.7–14.0	6.0 ± 3.1/10.1	0.1–12.5	3.3 ± 1.4/2.1	0–5.9
D6	1.3 ± 2.0/4.0	-0.1–7.0	3.2 ± 1.7/2.8	0–6.2	2.9 ± 1.1/1.3	1.0–5.7
D7	5.1 ± 2.8/8.0	0.3–11.5	4.5 ± 2.0/4.1	0.1–8.1	3.5 ± 1.5/2.2	1.4–7.5
D8	3.7 ± 1.4/2.0	1.5–6.3	4.3 ± 1.1/1.1	1.9–6.4	3.9 ± 1.0/1.0	2.1–5.8
D9	5.3 ± 2.7/7.1	0.1–9.6	4.8 ± 2.2/4.8	0.1–9.0	4.0 ± 1.5/2.3	1.7–6.8
D10	5.5 ± 2.9/8.4	0.1–11.0	4.8 ± 2.3/5.4	0.1–9.6	4.0 ± 1.6/2.7	1.4–7.4
D11	5.8 ± 2.9/8.3	0.1–11.0	5.2 ± 2.3/5.3	0.1–9.0	4.2 ± 1.6/2.7	1.7–7.2
D12	5.0 ± 2.5/6.4	0.2–9.1	4.6 ± 2.1/4.6	0.1–8.7	3.9 ± 1.5/2.7	1.7–7.2
C (Контроль)	2.9 ± 1.8/3.4	-0.1–6.7	3.1 ± 1.6/2.6	0.1–5.8	2.9 ± 1.3/1.6	0.7–5.6

Окремо вивчили загальну різницю між показниками температури поверхні ґрунту зафікованими за допомогою логерів. Протягом грудня 2017 р. різниця середньої денної температури поверхні ґрунту в один і той самий день між дослідженями популяціями складала в середньому 6 °C, мінімальна різниця — 1.7 °C, максимальна — 12.1 °C; Протягом січня 2018 р. — в середньому 3.8 °C, мінімальна різниця — 1.6 °C, максимальна — 8.0 °C; Протягом лютого 2018 р. — в середньому 2.6 °C, мінімальна різниця — 1.0 °C, максимальна — 4.6 °C. Таким чином, повністю підтвердилася очікувана температурна гетерогенність досліджуваних локалітетів.

Грунти, на яких існують досліджені популяції *D. antarctica*, належать до лептосолів. Вони характеризуються слабо-кислою та кислою реакцією, в залежності від кількості органічних залишків рослин, що слугували головним джерелом органогенів (Parnikoza et al., 2016).

На першому етапі дослідження ми отримали набір первинних значень проективного покриття, морфометричних показників та вмісту окремих фракцій запасних та захисних білків насіння *D. antarctica* сезону 2017/18 рр., частину отриманих даних наведено у табл. 2. На наступному етапі отримано набір попарних порівнянь за допомогою визначення абсолютноого значення різниць для показника проективного покриття (ΔS) і вмісту окремих фракцій білків насіння (ΔPr) та за допомогою критерію медіані у випадку визначення відстаней між медіанами розподілів кількох морфометричних показників (ΔPh) (Поллард, 1982). Ці результати наведено в табл. 3. Усі морфометричні показники виявили-

ся мінливими і залежали, імовірно, від мікроумов зростання в макрокліматичній ситуації конкретного сезону (див. табл. 2).

Відносний вміст фракцій білків насіння наведено у табл. 2. Тут подано середні значення часток груп білків відносно загального пулу білків насіння *D. antarctica* за розмірами, що відповідають глобулінам — >150 кДа; глутенінам — 94–145 кДа; S-бідним проламінам — 45–80 кДа; S-багатим проламінам — 20–40 кДа; частині S-багатих проламінів і, ймовірно, білку IRIP — 27–31 кДа, характерним для пшениці м'якої *Triticum aestivum* L. Цікаво відмітити, що насіння рослин популяцій D2, D6 та D7 містить надзвичайно малу кількість білків. Ми пояснюємо це тим, що насіння цих популяцій у вивченому сезоні було, скоріше за все, незрілим.

Після визначення в дослідженіх популяціях часток окремих груп запасних та захисних білків насіння *D. antarctica* було проведено попарне порівняння популяцій за спектром з п'яти головних фракцій білків насіння. Результати для сезону 2017/2018 рр. наведено у табл. 3.

Таблиця 2. Значення проективного покриття, деяких морфометричних показників та відносний вміст фракцій запасних та захисних білків насіння рослин досліджених популяцій *D. antarctica* з о. Галіндез у сезоні 2017/2018 pp.

Популяція	Проективне покриття, %	Морфометричні показники				Відносний вміст фракцій запасних та захисних білків насіння				
		Довжина листка, см	Довжина суцвіття, см	Довжина квітки, см	Кількість квіток у суцвітті, шт	>150 кДа	94-145 кДа	45-80 кДа	20-40 кДа	27-31 кДа
D1	1	5.6 ± 0.2/86	4.1 ± 0.1/40	0.54 ± 0.01/153	45.9 ± 3.4/35	0.201	0.11	0.156	0.410	0.110
D2	30	2.7 ± 0.1/65	2.5 ± 0.2/23	0.54 ± 0.01/83	16.5 ± 1.9/20	0.256	0.109	0.089	0.453	0.128
D3	3	4.3 ± 0.2/90	4.9 ± 0.4/11	0.52 ± 0.01/189	31.4 ± 4.3/11	0.132	0.114	0.174	0.431	0.118
D4	3	2.1 ± 0.1/75	2.8 ± 0.3/3	0.51 ± 0.01/28	18.3 ± 7.2/3	0.184	0.096	0.155	0.420	0.102
D5	1	2.2 ± 0.1/69	1.6 ± 0.2/10	0.42 ± 0.01/69	26.7 ± 4.2/12	0.171	0.104	0.161	0.416	0.092
D6	3	2.2 ± 0.1/94	2.8 ± 0.2/26	0.44 ± 0.01/116	24.7 ± 2.6/32	0.330	0.100	0.070	0.430	0.150
D7	5	3.3 ± 0.1/100	4.3 ± 0.2/42	0.51 ± 0.01/460	27.3 ± 1.7/43	0.368	0.124	0.108	0.341	0.124
D9	15	2.5 ± 0.1/96	3.5 ± 0.2/33	0.48 ± 0.01/233	22.7 ± 1.3/35	0.154	0.146	0.272	0.281	0.064
D10	5	3.2 ± 0.1/93	4.8 ± 0.4/21	0.52 ± 0.01/208	31.7 ± 2.7/21	0.214	0.102	0.170	0.413	0.110
D11	1	2.1 ± 0.1/107	3.5 ± 0.2/23	0.49 ± 0.01/260	17.4 ± 1.2/25	0.173	0.096	0.191	0.441	0.103
D12	10	3.7 ± 0.2/83	4.6 ± 0.4/29	0.52 ± 0.01/287	25.4 ± 2.6/27	0.250	0.116	0.141	0.412	0.105

Примітка. *Схема, за якою наведено дані у комірках таблиці для морфометричних показників: середнє вибіркове значення ± середнє вибіркове відхилення/кількість вимірюваних об'єктів.

Таблиця 3. Результати попарних порівнянь за проективним покриттям ($|\Delta S|$), морфометричними показниками ($|\Delta Ph|$) та за вмістом п'яти фракцій білків насіння ($|\Delta Pr|$) *D. antarctica* одинадцяти популяцій о. Галіндез у сезоні 2017/2018 рр.

Порів- нювані популяції	$ \Delta S $, %	$ \Delta Ph $ за параметрами				$ \Delta Pr $ для фракцій білків насіння				
		(довжина листка)	(довжина суцвіття)	(довжина квітки)	(к-сть квіток у суцвітті)	> 150 кДа	94-145 кДа	45-80 кДа	20-40 кДа	27-31 кДа
D1 - D2	29	53.64	14.49	0	16.59	0.055	0.001	0.067	0.043	0.018
D1 - D3	2	11.01	10.84	0	0	0.069	0.004	0.018	0.021	0.008
D1 - D4	2	95.07	0	7.92	0	0.017	0.014	0.001	0.01	0.008
D1 - D5	0	78.89	7.04	43.85	0	0.03	0.006	0.005	0.006	0.018
D1 - D6	2	90.05	10.39	73.15	12.98	0.131	0.008	0.08	0.023	0.047
D1 - D7	4	53.31	0	30.51	16.49	0.167	0.014	0.048	0.069	0.014
D1 - D9	14	88.48	0	60.36	27.86	0.047	0.036	0.116	0.129	0.046
D1 - D10	4	52.39	0	0	4.98	0.013	0.008	0.014	0.003	0.0
D1 - D11	0	110.68	4.88	59.81	35.06	0.028	0.014	0.035	0.031	0.007
D1 - D12	9	14.03	0	16.48	12.42	0.049	0.006	0.015	0.002	0.005
D2 - D3	27	16.58	10.88	0	7.44	0.124	0.005	0.085	0.022	0.01
D2 - D4	27	11.12	0	6.96	0	0.072	0.013	0.066	0.033	0.026
D2 - D5	29	3.89	3.86	38.86	0	0.085	0.005	0.072	0.037	0.036
D2 - D6	27	5.16	0	65.77	0	0.076	0.007	0.013	0.02	0.029
D2 - D7	25	9.22	22.27	18.33	5.02	0.144	0.015	0.019	0.112	0.004
D2 - D9	15	0	7.48	45.34	0	0.102	0.037	0.183	0.172	0.064
D2 - D10	25	0	18.05	0	14.76	0.042	0.007	0.081	0.04	0.018
D2 - D11	29	5.78	0	42.79	0	0.083	0.013	0.102	0.012	0.025
D2 - D12	20	6.12	16.7	10.29	0	0.006	0.007	0.052	0.041	0.023
D3 - D4	0	83.77	0	7.64	0	0.052	0.018	0.019	0.011	0.016
D3 - D5	2	34.47	17.33	43.9	0	0.039	0.01	0.013	0.015	0.026
D3 - D6	0	75.67	20.34	73.52	0	0.2	0.012	0.098	0.002	0.039
D3 - D7	2	12.9	0	32.44	0	0.236	0.01	0.066	0.09	0.006
D3 - D9	12	37.12	10.16	62.23	4.79	0.022	0.032	0.098	0.15	0.054
D3 - D10	2	12.93	0	0	0	0.082	0.012	0.004	0.018	0.008
D3 - D11	2	81.51	13.05	62.25	7.63	0.041	0.018	0.017	0.01	0.015
D3 - D12	7	0	0	16.94	0	0.118	0.002	0.033	0.019	0.013
D4 - D5	2	0	6.28	9.26	0	0.013	0.008	0.006	0.004	0.01
D4 - D6	0	0	0	21.52	0	0.148	0.006	0.079	0.013	0.055
D4 - D7	2	40.89	0	0	0	0.184	0.028	0.047	0.079	0.022
D4 - D9	12	7.89	0	0	0	0.03	0.05	0.117	0.139	0.038
D4 - D10	2	26.08	0	6.63	0	0.03	0.006	0.015	0.007	0.008
D4 - D11	2	0	0	0	0	0.011	0.0	0.036	0.021	0.001
D4 - D12	7	33.53	0	0	0	0.066	0.02	0.014	0.008	0.003
D5 - D6	2	0	6.11	0	0	0.161	0.002	0.085	0.017	0.065
D5 - D7	4	25.71	0	0	0	0.197	0.02	0.053	0.075	0.032
D5 - D9	14	0	0	5.56	0	0.017	0.042	0.111	0.135	0.028
D5 - D10	4	14.09	9.31	41.08	4.17	0.043	0.002	0.009	0.003	0.018
D5 - D11	0	0	8.21	7.11	3.97	0.002	0.008	0.03	0.025	0.011
D5 - D12	9	19.98	8.42	21.33	0	0.079	0.012	0.02	0.004	0.013
D6-D7	2	32.56	18	32.76	0	0.036	0.022	0.032	0.092	0.033
D6 - D9	12	0	0	12.95	0	0.178	0.044	0.196	0.152	0.093
D6 - D10	2	18.17	13.56	69.49	7.22	0.118	0.0	0.094	0.02	0.047
D6 - D11	2	0	0	15.6	4.22	0.159	0.006	0.115	0.008	0.054
D6 - D12	7	25.31	12.46	39.09	0	0.082	0.014	0.065	0.021	0.052
D7 - D9	10	17.8	7.76	14.91	0	0.214	0.022	0.164	0.06	0.06
D7 - D10	0	0	0	28.26	5.86	0.154	0.022	0.062	0.072	0.014

Порівняні популяції	$ \Delta S $, %	$ \Delta Ph $ за параметрами				$ \Delta Pr $ для фракцій білків насіння				
		(довжина листка)	(довжина суцвіття)	(довжина квітки)	(к-сть квіток у суцвітті)	> 150 кДа	94-145 кДа	45-80 кДа	20-40 кДа	27-31 кДа
D7- D11	4	35.83	10.67	12.35	9.35	0.195	0.028	0.083	0.1	0.021
D7 - D12	5	0	0	0	0	0.118	0.008	0.033	0.071	0.019
D9 - D10	10	7.41	4.81	57.67	13.64	0.06	0.044	0.102	0.132	0.046
D9 - D11	14	0	0	0	3.88	0.019	0.05	0.081	0.16	0.039
D9 - D12	5	12.6	3.88	21.26	0	0.096	0.03	0.131	0.131	0.041
D10- D11	4	20.15	7.48	57.48	21.61	0.041	0.006	0.021	0.028	0.007
D10 - D12	5	3.94	0	13.94	5	0.036	0.014	0.029	0.001	0.005
D11 - D12	9	27.81	6.51	18.78	3.89	0.077	0.02	0.05	0.029	0.002

Усі набори попарних порівнянь популяцій, які наведено в табл. 3, групували за трьома параметрами попарних різниць показників пристосованості між популяціями: $|\Delta S|$ – ΔPh , $|\Delta S|$ – $|\Delta Pr|$ та ΔPh – $|\Delta Pr|$, як описано в роботах

(Parnikoza et al, 2015, Мірюта та ін., 2017а, б). На підставі отриманих результатів було вираховано зведений латентний показник пристосованості (ЗЛПП) (рис. 1).




Рис. 1. Зведений латентний показник пристосованості (ЗЛПП) для одинадцяти досліджених популяцій *D. antarctica*, о. Галіндез у сезоні 2017/18 рр.

При порівнянні даних середньомісячних температур поверхні ґрунту (табл. 1, рис. 2а) із ЗЛПП видно, що шукати кореляційні залежності між ними немає сенсу. Ми припустили, що більш ефективним буде пошук залежностей кожного з досліджених показників пристосованості від температури. Виявилось, що при безпосередньому порівнянні наборів даних відносно просторового розподілу температур для всіх вимірюваних показників пристосованості кореляцій виявлено не було, за виключенням відносного вмісту білків IRIP у грудні 2017 р. та

січні 2018 р. Тому ми розділили їх шляхом екстремального групування на групи з достовірною позитивною та негативною кореляцією і визначили ймовірність потрапляння в ту чи іншу групу рослин кожної з популяцій, значення якої після нормування назвали зведеним показником впливу температури (ЗПВТ). На рис. 2 представлено результати вимірюв середньомісячної температури (рис. 2а) та зведені показники впливу температури (ЗПВТ) для 11 досліджених популяцій.




Рис. 2. Розподіл по місяцях середньомісячних температур $T^{\circ}\text{C}$ (а) та зведеного показника впливу температури (ЗПВТ) (б) на показники пристосуваності досліджених популяцій *D. antarctica*.

Аналогічним чином на основі вищезгаданих даних про хімічний склад ґрунту (рис. 3а) отримано показник, що описує їх вплив на прое-

ктивне покриття — зведений показник впливу вмісту органогенів у ґрунті (ЗПВГ) (рис. 3б).




Рис. 3. Вміст органогенів у ґрунті (а) та зведений показник впливу вмісту органогенів у ґрунті на проективне покриття (ЗПВГ) (б) досліджених популяцій *D. antarctica*.

Біологічний зміст обох розрахованих зведеніх показників впливу можна описати так: позитивні їх значення мають популяції, у рослин з яких невеликі/великі зміни у температурі поверхні/вмісті органогенів ґрунту місцезростання супроводжуються невеликими/великими змінами у досліджених показниках пристосуваності (для відповідної пари популяцій). До негативної групи належать популяції, у рослин з яких невеликі/великі зміни у температурі поверхні/вмісті органогенів ґрунту місцезростання супроводжуються великими/невеликими змінами у всіх досліджених показниках пристосуваності (для ЗПВТ)/проективному покритті (для ЗПВГ) (для відповідної пари популяцій).

Негативний варіант є більш складним, тому що містить дві групи з протилежною реакцією на зміни, тож треба індивідуально аналізувати до якої з підгруп належить та чи інша популяція. Наприклад, у популяції D2 ЗПВТ близьке до 0 ЗПВГ є негативним. При цьому для D2 найбільший внесок у знак ЗПВТ та ЗПВГ здійснюють просторові різниці температури поверхні та складу органогенів ґрунтів, що впливають на просторові різниці у проективному покритті (табл. 4). Проективне покриття в нашому дослідженні виявилося найбільш стабільним показником, що має найбільший час релаксації (Мірюта та ін., 2017а). Аналогічно, стабільним показником, найімовірніше, є також вміст органогенів ґрунтів. Температура поверхні ґрунту є найменш стабільним показником і має найменший час релаксації. Зміни у проективному покритті залежно від просторових змін температури та складу органогенів ґрунтів у випадку популяції D2 можуть потрапляти в різні групи, але частіше за все — у негативну групу (див. табл. 4). Це означає, що невеликі просторові зміни температури поверхні та складу органогенів ґрунтів відповідають великим просторовим відмінностям з більшістю популяцій, окрім популяцій D5 та D6. У випадку великих просторових відмінностей між популяціями D2–D5, та D2–D6 у температурі поверхні та складі органогенів ґрунтів наявні також великі просторові відмінно-

сті у проективному покритті. Ці факти наводять на думку про можливу малу залежність проективного покриття від просторового розподілу температур поверхні та вмісту органогенів ґрунтів на о. Галіндез. Це добре узгоджується з відомостями про особливості природних місцезростань *D. antarctica* в районі Аргентинських островів, в якому площа, яку можуть зайняти рослини, навіть в мікрокліматично-придатному локалітеті, лімітується таким фактором, як площа вільного простору між камінням чи наявним покриттям мохоподібних.

Ці обставини наводять на думку, що маючи високе значення проективного покриття, популяція D2 порівняно з іншими популяціями, є найбільш незалежною від зовнішніх умов. У її випадку зовнішні умови впливають на варіації пристосуваності окремих рослин за іншими показниками. Це сприяє успіху цієї популяції, яка виникла, ймовірно, внаслідок захисту будинком станції, а можливо і за іншої допомоги людини чи покращення умов зростання на острові впродовж 1964–1990 рр. (Fowbert, Smith, 1994). Загалом, чим більша за чисельністю популяція, тим вона успішніша. Проте це не означає, що малі популяції не мають можливості вижити. Їх пристосуваність забезпечується за рахунок інших механізмів, що не вивчалися у цій роботі.

Як ми вже зазначали, вплив температури не був рівномірним впродовж усього часу дослідження. Внески впливу чинника температури у окремі місяці сезону у дослідженні показники пристосуваності, наведені у таблиці 4.

На основі внесків, наведених у табл. 4, визначали зведеній показник впливу температури для кожного місяця окремо: ЗПВТ₁ для грудня 2017 р., ЗПВТ₂ для січня 2018 р., ЗПВТ₃ для лютого 2018 р. На їх основі визначали їх середнє значення ЗПВТ_c = (ЗПВТ₁ + ЗПВТ₂ + ЗПВТ₃)/3 (рис. 4, табл. 5).

Внесок зведеного показника впливу вмісту органогенів у ґрунті (ЗПВГ) у ЗЛПП розглядали як окремо, так і сумарно з внеском температури за весь сезон: ЗПВТ_c + ЗПВГ = ЗПВТ_{cG} (рис. 4, табл. 5).

Визначення зведеного латентного показника пристосуваності (ЗЛПП) із врахуванням внеску...

Таблиця 4. Внески змін температури у просторові різниці показників вмісту різних фракцій білків на-
сіння ($|\Delta Pr|$), морфометричних показників (ΔPh) та проективного покриття ($|\Delta S|$)

Популяція	($ \Delta Pr - \Delta T_1 $) x50	($ \Delta Pr - \Delta T_2 $) x50	($ \Delta Pr - \Delta T_3 $) x50	($\Delta Ph - \Delta T_1 $) x40	($\Delta Ph - \Delta T_2 $) x40	($\Delta Ph - \Delta T_3 $) x40	($ \Delta S - \Delta T_1 $) x10	($ \Delta S - \Delta T_2 $) x10	($ \Delta S - \Delta T_3 $) x10	ЗПВТ _c	ЗПВГ
D1	0.72	0.72	0.62	0.025	0.225	0.575	0.7	0.6	-0.6	1.195	0.28
D2	0.1	0.36	0.3	0.05	0.35	-0.05	-0.8	-0.8	0.5	0.003	-0.5
D3	0.66	0.7	0.68	0.65	0.325	0.65	0.7	0.7	0.6	1.888	0
D4	0.4	0.36	0.42	0.875	0.6	0.725	0.6	0.6	0.7	1.76	-0.44
D5	0.36	0.52	-0.18	0.7	-0.8	0.35	0.6	0.5	0.6	0.88	-0.167
D6	-0.1	0.16	0.16	-0.05	-0.35	0.225	-0.8	-0.9	-0.8	-0.818	0.111
D9	-0.56	-0.46	-0.12	0.7	0.35	0.275	-0.9	-0.8	-0.7	-0.738	0.222
D10	0.52	0.48	0.68	0.45	0.475	0.7	0.7	0.6	0.7	1.768	0.222
D11	0.76	0.5	0.58	0.6	0.25	-0.05	0.7	0.8	-0.7	1.15	0.111
D12	0.46	0.2	0.38	0.9	0.8	0.775	0.8	0.7	0.6	1.872	0.167

де T_1 — середня температура у грудні 2017 р., T_2 — у січні 2018 р., T_3 — у лютому 2018 р.; результиуючі показники впливу температури за три літні місяці ($ZPVT_c = (ZPVT_1 + ZPVT_2 + ZPVT_3)/3$) та просторових змін вмісту органогенів ґрунтів (ЗПВГ) у просторові різниці показника проективне покриття досліджених популяцій *D. antarctica* o. Галіндез.

На основі внесків, наведених у табл. 4, визначали зведенний показник впливу температури для кожного місяця окремо: ЗПВТ₁ для грудня 2017 р., ЗПВТ₂ для січня 2018 р., ЗПВТ₃ для лютого 2018 р. На їх основі визначали їх середнє значення ЗПВТ_c = ($ZPVT_1 + ZPVT_2 + ZPVT_3)/3$) (рис. 4, табл. 5).

Внесок зведеного показника впливу вмісту органогенів у ґрунті (ЗПВГ) у ЗЛПП розглядали як окремо, так і сумарно з внеском температури за весь сезон: $ZPVT_c + ZPVG = ZPVT_cG$ (рис. 4, табл. 5).

Таблиця 5. Внески у зведеній латентний показник пристосуваності (ЗЛПП) зведеного показника впливу температури поверхні ґрунту (ЗПВТ) та зведеного показника впливу органогенів ґрунтів (ЗПВГ)

Пари наборів показників	n	R ²	F _{1, n-2}	F _{1,n-2} ($\alpha = 0.05$)	R
ЗЛПП-ЗПВТ ₁	11	0.6778	18.94	5.12	0.823
ЗЛПП-ЗПВТ ₂	11	0.4989	8.96	5.12	0.708
ЗЛПП-ЗПВТ ₃	11	0.2978	3.81	5.12	0.55
ЗЛПП-ЗПВТ _c	11	0.585	12.636	5.12	0.765
ЗЛПП-ЗПВГ	10	0.0384	0.320	5.32	0.196
ЗЛПП-ЗПВТ _{cG}	10	0.8405	42.160	5.32	0.917

де ЗПВТ₁ — зведенний показник впливу температури поверхні ґрунту у грудні 2017 р., ЗПВТ₂ — у січні 2018 р., ЗПВТ₃ — у лютому 2018 р.; ЗПВТ_c = ($ZPVT_1 + ZPVT_2 + ZPVT_3)/3$, ЗПВГ — зведенний показник впливу вмісту органогенів ґрунтів, ЗПВТ_{cG} = ЗПВТ_c + ЗПВГ, n — кількість досліджених популяцій, R² — квадрат коефіцієнта кореляції, F_{1,n-2} — значення критеріальної статистики, F_{1,n-2} ($\alpha = 0.05$) — верхня 5 % межа F-розподілу, R — коефіцієнт кореляції, еквівалентний внеску відповідного показника впливу у ЗЛПП.




Рис. 4. Зведений показник впливу температури поверхні ґрунту за три літні місяці $\Sigma\text{ПВТ}_c$ на морфометричні параметри, вміст окремих білків насіння та проективне покриття *D. antarctica* о. Галіндез (а), зведений показник впливу вмісту органогенів ґрунту ($\Sigma\text{ПВГ}$) на проективне покриття (в); сумарний зведений показник впливу температури поверхні та органогенів ґрунту ($\Sigma\text{ПВТ}_c\Gamma$ = $\Sigma\text{ПВТ}_c + \Sigma\text{ПВГ}$) на окрімі досліджені показники пристосуваності (д). Залежність зведеного латентного показника пристосуваності ($\Sigma\text{ЛПП}$) від $\Sigma\text{ПВТ}_c$ (б), $\Sigma\text{ПВГ}$ (г), $\Sigma\text{ПВТ}_c\Gamma$ (е).

Аналіз даних, наведених у табл. 5 дозволяє зробити висновок, що найбільший внесок (блізько 80 %) чиннику температури поверхні ґрунту у ЗЛПП популяцій *D. antarctica* острова Галіндез має місце в грудні 2017 р. ($\Sigma\text{ПВТ}_1$). У січні 2018 р. ($\Sigma\text{ПВТ}_2$) — 70 %, у лютому 2018 р. ($\Sigma\text{ПВТ}_3$) значення внеску не було достовірним. Середнє значення зведеного показника впливу температури протягом літніх місяців антарктичного сезону —

$\Sigma\text{ПВТ}_c$ складало 76 %. Внесок $\Sigma\text{ПВГ}$ у ЗЛПП не був достовірним (блізько 20 %). Проте сумарний внесок $\Sigma\text{ПВГ}$ з $\Sigma\text{ПВТ}_c$ — $\Sigma\text{ПВТ}_c\Gamma$ збільшився до блізько 90 %. Слід зауважити, що в цьому дослідженні не було враховано вплив вологості, засоленості та інших факторів (вони залишилися латентними), які можуть або збільшити, або зменшити внесок $\Sigma\text{ПВТ}_c\Gamma$ у ЗЛПП.

Висновки

- Охарактеризовано температуру поверхні ґрунту впродовж грудня 2017 – лютого 2018 рр. для дванадцяти популяцій рослин *Deschampsia antarctica* та контрольної ділянки угруповання торф'янистих мохів острова Галіндез, Аргентинські острови, Морська Антарктика. Показано значні варіації середньодобової температури поверхні ґрунту впродовж дослідженого літнього періоду між локусами, у яких зростають дослідні популяції, особливо у грудні та січні.
- На основі вимірювань для літніх місяців антарктичного сезону 2017/18 рр. показників проективного покриття, морфометричних показників генеративних рослин та відносного вмісту білків насіння розраховано значення зведеного латентного показника пристосуваності (ЗЛПП) для одинадцяти популяцій *D. antarctica*.
- Для літніх місяців даного антарктичного сезону розраховано значення зведеного показника впливу температури поверхні ґрунту (ЗПВТ) та зведеного показника впливу вмісту органогенів у ґрунті (ЗПВГ) на пристосуваність рослин *D. antarctica*. Показано, що достовірний внесок ЗПВТ у ЗЛПП має місце в грудні і січні, в момент найбільшої варіації температури, ЗПВГ дає внесок у ЗЛПП лише у сумі із ЗПВТ_c — середнім значенням зведеного показника впливу температури поверхні ґрунту за всі літні місяці антарктичного сезону.

Перелік літератури

- Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. Москва: Финансы и статистика. 1989. 606 с.
- Мірюта Н., Парнікова І., Швидун П., Мірюта Г., Пороннік О., Козерецька І., Кунах В. Динаміка зведеного латентного показника пристосуваності популяцій *Deschampsia antarctica* Desv. у районі о. Галіндез (Аргентинські острови, Прибрежна Антарктика) протягом трьох сезонів. Український антарктичний журнал. 2015. № 14. С. 143–157.
- Мірюта Н., Парнікова І., Олійник М., Сметана Є., Мірюта Г., Пороннік О., Кунах В. П'ятирічна динаміка зведеного латентного показника пристосуваності популяцій *Deschampsia antarctica* Desv. у районі о. Галіндез (Морська Антарктика. Український антарктичний журнал. 2017а. № 16. С. 189–202.
- Мірюта Н. Ю., Парнікова І. Ю., Пороннік О. О., Мірюта Г. Ю., Кунах В. А. Рослини *Deschampsia antarctica* É. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування *in vitro*. Ймовірнісні зв'язки трьох показників пристосуваності між собою та з розміром геному. Факт. експ. евол. орг. 2017б. Т. 20, С. 293–298.
- Парнікова І. Ю., Мірюта Н. Ю., Ройек М., Бетехтін А. А., Пороннік О. О., Мірюта Г. Ю., Навроцька Д. О., Хастерок Р., Кунах В. А. Рослини *Deschampsia antarctica* É. Desv. з різним числом хромосом в умовах вирощування *in vitro*. Зв'язок розміру геному та двох показників пристосуваності. Факт. експ. евол. орг. 2017. Т. 20. С. 304–308.
- Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. Москва: Финансы и статистика. 1982. 344 с.
- Fowbert J. A., Smith R. I. L. Rapid population increases in native vascular plants in the Argentine Islands Antarctic Peninsula. Arctic and Alpine Research, 1994. Vol. 26, № 3. P. 290–296.
- Kennicutt I. M. C., Chown S. L., Cassano J. J., Liggett D., Massom R., Peck L. S., Rintoul S. R., Storey J. W. V., Vaughan D. G., Wilson T. J., Sutherland W. J. Six priorities for Antarctic science. Nature. 2014, Vol. 512. P. 23–25. doi: 10.1038/512023a.
- Parnikoza I., Convey P., Dykyy I., Trokhymets V., Milinevsky G., Inozemtseva D., Kozeretska I. Current status of the Antarctic herb tundra formation in the central Argentine Islands. Global Change Biol. 2009, Vol. 15. P. 1685–1693. doi: 10.1007/s00300-015-1704-1.
- Parnikoza I., Miryuta N., Ozheredova I., Kozeretska I., Smykla J., Kunakh V., Convey P. Comparative analysis of *Deschampsia antarctica* Desv. population adaptability in the natural environment of the Admiralty Bay region (King George Island, maritime Antarctic). Polar Biology. 2015. Vol. 38, № 9. P. 1401–1411.
- Parnikoza I., Abakumov E., Korsun S., Klymenko I., Netsyk M., Kudinova A., Kozeretska I. Soils of the Argentine Islands, Antarctica: Diversity and Characteristics. Polarforschung. 2016. Vol. 86, № 2. P. 83–96.
- Torres-Mallado G. A., Jana R., Casanova-Katny M. A. Antarctic hairgrass expansion in the South Shetland archipelago and Antactic Peninsula revisited. Polar Biology. 2011. Vol. 34. P. 1679–1688. doi: 10.3389/fevo.2018.00152.

References

- Aivazjan S. A., Buhshtaber V. M., Enukov I. S., Meshalkin L. D. Prikladnaja statistika. Klassifikacija i snizhenie razmernosti. Moskva: Finansy i statistika. 1989. 606 s.
- Miryuta N., Parnikoza I., Shvidun P., Myryuta G., Poronnik O., Kozerecka I., Kunakh V. Dinamika zvedenogo latentnogo pokaznika pristosovuvanosti populjacij *Deschampsia antarctica* Desv. u rajoni o. Galindez (Argentinskie ostrova, Pribrezhnaja

- Antarktika) protjagom troch sezonyiv. *Ukrajinskij antarktichnij zhurnal*. 2015. № 14. S. 143–157.
3. Myryuta N., Parnikoza I., Olynik M., Smetana E., Myryuta G., Poronnik O., Kunakh V. Pjatyrichna dinamika zvedenogo latentnogo pokaznika pristosovuvanosti populacij *Deschampsia antarctica* o. Galindez (Morska Antarktyka. *Ukrajinskij antarktichnij zhurnal*. 2017a. № 16. S. 189–202.
 4. Myryuta N. Yu., Parnikoza I. Yu., Poronnik O. O., Myryuta G. Yu., Kunakh V. A. Roslini *Deschampsia antarctica* É. Desv. z riznim chislom chromosom v umovah viroschuvannja *in vitro*. Jmovirnisi zviazki troch pokaznikiv pristosovuvanosti mizh soboju ta z rozmirom genomu. *Fakt. eksp. evol. org.* 2017b. T. 20, S. 293–298.
 5. Parnikoza I. Yu., Myryuta N. Yu., Rojek M., Betekhtin A. A., Poronnik O. O., Myryuta G. Yu., Navrotska D. O., Hasterok R., Kunakh V. A. Roslynny *Deschampsia antarctica* É. Desv. z riznim chislom chromosom v umovah viroschuvannja *in vitro*. Zviazok rozmiru genomu ta dvoch pokaznikiv pristosovuvanosti. *Fakt. eksp. evol. org.* 2017. T. 20. S. 304–308.
 6. Pollard J. Spravochnik po vychislitelnym metodam statistiki. Moskva: Finansy i statistika. 1982. 344 s.
 7. Fowbert J. A., Smith R. I. L. Rapid population increases in native vascular plants in the Argentine Islands Antarctic Peninsula. *Arctic and Alpine Research*, 1994. Vol. 26, № 3. P. 290–296.
 8. Kennicutt I. M. C., Chown S. L., Cassano J. J., Liggett D., Massom R., Peck L. S., Rintoul S. R., Storey J. W. V., Vaughan D. G., Wilson T. J., Sutherland W. J. Six priorities for Antarctic science. *Nature*. 2014, Vol. 512. P. 23–25. doi: 10.1038/512023a.
 9. Parnikoza I., Convey P., Dykyy I., Trokhymets V., Millinevsky G., Inozemtseva D., Kozeretska I. Current status of the Antarctic herb tundra formation in the central Argentine Islands. *Global Change Biol.* 2009. Vol. 15. P. 1685–1693. doi: 10.1007/s00300-015-1704-1.
 10. Parnikoza I., Myryuta, N., Ozheredova, I., Kozeretska, I., Smykla, J., Kunakh, V., Convey, P. Comparative analysis of *Deschampsia antarctica* Desv. population adaptability in the natural environment of the Admiralty Bay region (King George Island, maritime Antarctic). *Polar Biology*. 2015. Vol. 38, № 9. P. 1401–1411.
 11. Parnikoza I., Abakumov E., Korsun S., Klymenko I., Netsyk M., Kudinova A., Kozeretska I. Soils of the Argentine Islands, Antarctica: Diversity and Characteristics. *Polarforschung*. 2016. Vol. 86, № 2. P. 83–96.
 12. Torres-Mellado G. A., Jana R., Casanova-Katny M. A. Antarctic hairgrass expansion in the South Shetland archipelago and Antarctic Peninsula revisited. *Polar Biology*. 2011. Vol. 34. P. 1679–1688. doi: 10.3389/fevo.2018.00152.

Представлено І. А. Козерецькою
Надійшла 16.11.2018

DETERMINATION OF THE UNITED QUALITY LATENT INDEX OF ADAPTABILITY (UQLIA) AND CONTRIBUTION OF SOME ENVIRONMENTAL PARAMETERS TO IT FOR *DESCHAMPSIA ANTARCTICA* POPULATIONS, GALINDEZ ISLAND (MARITIME ANTARCTIC) SEASON 2017/2018

I. Yu. Parnikoza^{1,2}, N. Yu. Myryuta^{1,2}, V. Yu. Ivanets¹,
E. O. Dykyi¹

¹ State Institution National Antarctic Scientific Center of Ministry of Education and Sciences of Ukraine Ukraine, 01601, Kyiv, 16, Taras Shevchenko Blvd.

² Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine Ukraine, 03143, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150 e-mail: ivan.parnikoza@uac.gov.ua

The purpose of our work has been to determine the indicator of complex adaptability — the United Quality Latent Index of Adaptability (UQLIA) for the experimental populations of *Deschampsia antarctica* É. Desv. and study the contribution to it of some environmental factors such as the near soil surface temperature and organogens content.

Materials and methods. The determination of UQLIA was based on a pairwise comparison of the differences between investigated parameters of populations by mathematical regression techniques. The soil surface temperature was measured by loggers installed near plants in each locus during April 2017 – April 2018. **Results and conclusions.** Temperature fluctuations were described during December 2017 – February 2018 for twelve experimental populations of *D. antarctica* and one control fragment of moss turf sub-formation from Galindez Island. Significant variations in average daily near surface temperature were observed during the study period between populations, especially in December and January. The UQLIA of *D. antarctica* for this season was calculated on the basis of the projective cover, biometric indices of generative plants and the content of protective and reserve proteins in seeds for the eleven populations. The values of the United Soil Surface Temperature Influence Index (UTII) for the season summer months and the United Organogens Content in Soil Influence Index (UOCSII) have been calculated for the individual parameters of *D. antarctica* plants adaptability. The reliable contribution of UTII to ULIA has been shown for December and January, at the moment of the greatest variation of soil surface temperature. UOCSII provided a reliable contribution to the ULIA only in the amount of UTII.

Keywords: *Deschampsia antarctica*, United Quality Latent Index of Adaptability (UQLIA), contribution of soil surface temperature and organogens content to complex adaptability.