



ЗАМЕТКА

***Hydaticus schelkovnikovi* — новый для фауны Северо-Западного Кавказа вид семейства Dytiscidae (Coleoptera) [The First Records of *Hydaticus schelkovnikovi* (Coleoptera) in the Fauna on North-West Caucasus].** — Ранее с территории Северо-Западного Кавказа из рода *Hydaticus* Leach, 1817 было известно три вида: *Hydaticus* (*Guignotus*) *grammicus* Germar, 1827, *H.* (*Hydaticus*) *seminiger* DeGeer, 1774 и *H.* (*Hydaticus*) *transversalis* Pontoppidan, 1763 (Шаповалов, 2007). *Hydaticus schelkovnikovi* Zaitzev, 1913 — распространен в регионах Закавказья: Азербайджан: Геок-тапа; Армения: Эривань, Джелал-оглы; Грузия: Сухуми, Поти, Батум (Зайцев, 1927), Тбилиси и Караязы (Зайцев, 1953; Касымов, 1972), отмечен в Иране (Nilsson, 2003). Указывается для Юга России (Предкавказье) (Цалолихин, 2001; Nilsson, 2003) без детализации мест находок. В пределах Центрального Кавказа вид известен с территории Кабардино-Балкарской Республики (Львов, Хатухов, 2007). На территории Северо-Западного Кавказа вид ранее не отмечен. Материал: 1 экз., Краснодарский край: г. Краснодар (45°02'00" с. ш., 38°59'00" в. д.), пруд «Карасун», у берега в прибрежной растительности *Phragmites*, $t_{H_2O} = 18-20^{\circ}C$, глубина облавливаемых мест 0,3–0,5 м, дно илистое с листовным опадом, 12.05.2002 (Шаповалов); 3 экз., Краснодарский край: пос. Калинино (45°05'00" с. ш., 39°00'00" в. д.), пруд, водная вороночная ловушка, $t_{H_2O} = 22^{\circ}C$, дно илистое с отмершей растительностью, 19.06.2008 (Шаповалов). — **М. И. Шаповалов** (Адыгейский государственный университет, Майкоп).