



## ЗАМЕТКА

---

Зустріч савки, *Oxyura leucocephala* (Aves, Anseriformes), на Полтавщині [Record of the White-Headed Duck, *Oxyura leucocephala* (Aves, Anseriformes) in Poltava Region (Ukraine)]. — У книзі «Птицы Полтавщины» (1929) відомий вітчизняний орнітолог М. І. Гавриленко писав: «За время изучения орнитофауны Полтавщины эта утка [савка] ни разу мне не встречалась, и я вновь могу сослаться только на показание М. А. Марцинкевича, добывшего ее в 1908 г. на Ревазовке в Кобеляцком уезде». За усі роки спостережень починаючи з 1975 р. на р. Сухому Кагарлику савка трапилась нам вперше лише 10.10.2010. На річковому плесі у межах с. Пирогів було виявлено пару савок, *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769), одну з яких було здобуто (координати реєстрації: 49°20'N–33°11'E). Напередодні (9–10 жовтня) вночі пройшов сильний дощ з вітром, і, ймовірно, чимало різних видів качок, які мігрували Дніпром за 8–10 км від р. Сухого Кагарлика, шукали затишних місць. У ці дні на Сухому Кагарлику спостерігали також групи: попелюха (*Aythya ferina* (Linnaeus, 1758), черні чубатої (*Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) і гоголя *Vucephala clangula* (Linnaeus, 1758). Маса здобутої савки (♀ ad) біля 500 г, морфометричні виміри: крило — 154 мм, середній палець (з кігтем) — 68, цівка — 43, дзьоб — 44, ширина дзьоба (на рівні ніздрів) — 20, висота дзьоба — 21. Оперення досить обношене. На шії птаха досить значна зарубцьована рана. У шлунку знаходились дрібні камінці і подрібнена рослинна маса. — Ю. Ф. Роговий (Пирогівська середня школа).