



ЗАМЕТКА

Первая находка каракурта, *Latrodectus tredecimguttatus* (Aranei, Theridiidae), на Главной гряде Крымских гор [The First Record of the Black-Widow, *Latrodectus tredecimguttatus* (Aranei, Theridiidae), from Main Range of the Crimean Mountains]. — Каракурт, *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790), имеет широкий ареал: от Португалии на западе до Синьцзяна (Китай) на востоке, от Омска (Россия) на севере до Алжира и Египта на юге (Thorell T. Descriptions of several European and North African spiders // Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. 1875; Волянская Е. А. Материалы по экологии каракурта в окрестностях Омска // Тр. Укр. респ. науч. об-ва паразитологов. Киев: АН УССР. 1961; Song D. X. et al. The spiders of China. — Shijiazhuang : Hebei Science and Technology Publishing House, 1999; Helsdingen van P. Fauna Europaea: Araneae. Fauna Europaea version 2.4. 2011. — <http://www.faunaeur.org>). В высотном распространении каракурт достигает в горах Узбекистана 2500 м (Туркестанский хребет), а в Турции — 2000 м (в окр. Эрджиш и Карс) (Эргашев Н. Э. Экология ядовитых пауков Узбекистана. — Ташкент : ФАН, 1990. — 191 с.; Ваграм А. et al. Venomous spiders of Turkey (Araneae) // J. applied biological sciences. 2007). В Украине каракурт распространён в южных областях (Донецкая, Запорожская, Крым, Херсонская, Николаевская, Одесская) и ранее отмечался на высотах, не превышающих 400 м (Charitonov D. E. Katalog der russischen Spinnen. AN SSSR. — Leningrad : Izdatelstvo AN SSSR, 1932; Ковблюк Н. М. Распространение каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Aranei, Theridiidae) в Крыму и его биотопическая приуроченность // Вестн. зоологии, 2000). На северном макросклоне Крымских гор, на высоте 730 м, обнаружена неполовозрелая самка 4–5 возраста (Симферопольский р-н, 3 км к востоку от с. Перевальное, западный склон Долгоруковской яйлы, N 44°51'11", E 34°21'16.76", 730 м, каменная степь, 16.07.2011, leg. Надольный). Это первая на Украине регистрация каракурта на высоте более 700 м, а также первая находка каракурта на Главной гряде Крымских гор. В Крыму каракурт наиболее многочислен в равнинной части. Новая находка показывает, что он достигает в своём распространении нижних участков горных степей яйлы (700–800 м н. у. м.). — А. А. Надольный (Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь).